

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Oogziekten

Entropion, Ectropion

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

In deze brochure willen we u graag informeren over Entropion - Ectropion.

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel niet om een arts te raadplegen.

We wensen u een spoedig herstel.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is entropion	3
1.1 Oorzaken	
1.2 Behandeling	
1.3 Complicaties en bijwerkingen	
2. Wat is ectropion?	4
2.1 Oorzaken	
2.2 Behandeling	
2.3 Complicaties en bijwerkingen	
3. Ten slotte	6

01 WAT IS ENTROPION

Bij een entropion bestaat er een naar binnen gedraaide rand van het onder-ooglid.

Soms veroorzaakt dit maar weinig klachten; de afwijking hoeft dan niet noodzakelijk gecorrigeerd te worden.


Meestal echter krassen de naar binnen gedraaide haren van het onder-ooglid langs het hoornvlies, waardoor pijn, irritatie, last van het licht en een zandgevoel ontstaan. Door de krassende haren kan het hoornvlies beschadigd raken.

Wanneer een entropion klachten veroorzaakt, is het dan ook verstandig om de afwijking met een kleine operatie te laten verhelpen.

1.1 Oorzaken

Entropion wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de weefsels van het ooglid.

In zeldzame gevallen kan het veroorzaakt worden door verlittekening van de weefsels aan de binnenzijde van het onder-ooglid.



1.2 Behandeling

Wanneer het entropion het gevolg is van veroudering, kan het verholpen worden door de slappe van het onder-ooglid te corrigeren, door een snee onder de ooglidrand te maken en via deze snee de spier die het onder-ooglid naar buiten draait strakker te zetten.

Hiervoor is een operatie onder plaatselijke verdoving nodig van ongeveer 30 minuten.

Wanneer u bloedverdünnende middelen gebruikt, moet u ongeveer 10 dagen voor de operatie hiermee stoppen en deze eventueel laten vervangen door injecties. Raadpleeg hiervoor uw huisarts.

02 WAT IS ECTROPION?

1.3 Complicaties en bijwerkingen

Bij enkele geopereerde patiënten ontstaat een overcorrectie, wat betekent dat het ooglid na de operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit binnen 6 weken spontaan. Mocht dat niet zo zijn dan is een aanvullende operatie nodig.

Soms ontwikkelt zich een zwelling als reactie op de hechtingsmaterialen. Meestal geneest dit spontaan, anders kan de afwijking met een kleine ingreep worden verwijderd.

Recidief van het entropion is ook mogelijk.

Bij een ectropion bestaat er een naar buiten gedraaide rand van het onder-ooglid.

De afwijking is cosmetisch storend omdat de rode binnenzijde van het ooglid zichtbaar is. Vaak is ook het oog geïrriteerd omdat het minder goed sluit.

Ook kan het oog gaan tranen. Dit komt doordat het afvoerkanaaltje van de traanwegen (aan de neuskant in het onder-ooglid) geen contact meer maakt met het oog.

2.1 Oorzaken

Ectropion wordt op oudere leeftijd meestal veroorzaakt door veroudering van de weefsels van het ooglid, waardoor verslapping optreedt.

De afwijking kan ook veroorzaakt worden door een tekort aan huid als gevolg van huidziekten of littekens, en door zwelling als gevolg van een infectie of een tumor.



2.2 Behandeling

Wanneer het ectropion wordt veroorzaakt door verslapping kan dit verholpen worden door het ooglid strakker te zetten, soms in combinatie met het inkorten van de weefsels aan de binnenkant van het ooglid. Dit gebeurt met een operatie onder plaatselijke verdoving die ongeveer 30 minuten duurt.

Het is niet altijd mogelijk een perfect resultaat te krijgen; hoe langer de afwijking bestaat hoe moeilijker de correctie is. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u ongeveer 10 dagen voor de operatie hiermee stoppen. Raadpleeg hiervoor uw huisarts.

2.3 Complicaties en bijwerkingen

Tijdens de eerste week na de operatie kan er zwelling zijn van het ooglid.

Infectie komt zeer zelden voor.

De symptomen van een infectie zijn pijn en een etterige afscheiding. Bij het vroegtijdig uitvallen van hechtingen moet u de behandelend geneesheer contacteren.

03 TEN SLOTTE

In deze folder vindt u belangrijke informatie over een entropion en ectropion samengevat.

Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen.

www.zol.be/oogziekten

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be