

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Ooglidcorrectie (Blefaroplastie)

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u een blefaroplastie (ooglidcorrectie) moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer achtergrond informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: dr.K. Willekens (Oftalmoloog) | November 2025

INHOUDSTAFEL

1. Afhangende oogleden (wallen)	3
1.1 Wat zijn de verschijnselen?	
1.2 Doel van de operatie	
1.4 De voorbereiding	
1.5 De nazorg	
2. Ten slotte	5
Wij zijn u graag van dienst:	

01 AFHANGENDE OOGLEDEN (WALLEN)

Afhangende bovenoogleden ontstaan er als er een teveel aan huid is door verlies van elasticiteit van de weefsels.

Bij wallen van de onderoogleden is er eerder een teveel aan onderliggend vet. Beide problemen kunnen operatief verholpen worden. Zwarte kringen rond de ogen zijn een gevolg van hyperpigmentatie van de huid, dit kan operatief of via de laser spijtig genoeg niet verholpen worden.



1.1 Wat zijn de verschijnselen?


Zwelling van de oogleden of afhangen van de oogleden, meer opvallend naar de avond toe.

1.2 Doel van de operatie

Het doel van de operatie is het teveel aan huid en/of vet verwijderen.

De oogleden mogen tijdens de operatie niet te strak opgespannen worden, omdat dit uitdroging van het hoornvlies kan veroorzaken. De oogleden moeten na de operatie immers nog goed kunnen sluiten. Sommige patiënten hebben niet alleen afhangende bovenoogleden door een teveel aan huid, maar ook door gezakte wenkbrauwen. We spreken dan van 'browptosis'.

Indien u dit ook wilt laten corrigeren, zal een zwaardere ingreep nodig zijn (via de huid van het voorhoofd). Deze ingreep wordt door plastische chirurgen verricht.



De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving en in dagopname in het Ziekenhuis Oost-Limburg, campus Sint-Jan, Genk.

De insnede gebeurt met een laser. Die zorgt ook voor het dichtbranden van de bloedvaatjes. Men kan de geur van het dichtbranden waarnemen tijdens de operatie. De overtollige huid (vet) wordt verwijderd.

Op het einde van de ingreep wordt de huid gehecht met afzonderlijke hechtingen. Deze dienen na ongeveer 10 dagen verwijderd te worden op de consultatie.

Voordat u de operatiekamer verlaat, wordt er nog een drukcompress aangelegd op beide ogen, dat gedurende een tweetal uur ter plaatse moet blijven. Al die tijd verblijft u op een kamer in het dagziekenhuis. U rijdt best niet zelf naar huis.

1.3 De voorbereiding

U biedt zich op de dag van de operatie aan in het dagziekenhuis van campus Sint-Jan in Genk. Voor het juiste uur van opname kan u de dag voor de operatie bellen naar het volgende nummer: 089/32 51 12 (tussen 14 en 16 uur).

Opgelet, wanneer uw operatie doorgaat op een maandag moet u de vrijdag ervoor bellen.

De ingreep verloopt onder lokale verdoving. U hoeft niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, kan u de huisarts raadplegen voor eventuele stopzetting of vervanging van deze medicatie.

1.4 De nazorg

Wanneer u de dag van de operatie thuis komt, mag u bij pijn een gewone pijnstiller nemen. Aspirine wordt afgeraden omwille van het risico op nabloedingen.

Het kan zijn dat u de eerste dagen een forse zwelling en/of bloedingstoring van de oogleden heeft (zowel boven als onder).

02 TEN SLOTTE

De thuisverzorging bestaat uit Kammosan Compressen en oogzalf.

De oogzalf mag u aanbrengen zowel in het oog als op de wonde totdat de hechtingen worden verwijderd. De inname van de bloedverdunners, die tijdelijk stopgezet werd, mag u na 3 dagen opnieuw starten.

Het gebruik van make-up en zwemmen wordt best vermeden gedurende minstens 1 maand.

Met zonnebank en zonnebaden wordt best gedurende een tweetal maanden gewacht om pigmentatie van het litteken te vermijden. Wanneer de hechtingen na een 10-tal dagen verwijderd worden, moet u nog een 6-tal weken wachten op het uiteindelijke resultaat van de ingreep.

In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over een blefaroplastie of ooglidcorrectie samengevat.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u altijd contact met ons opnemen.

www.zol.be/oogziekten

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be