

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Eicelbank

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze informatiebrochure geeft u meer achtergrondinformatie over de werking van de eicelbank en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen.

Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is een eicelbank?	3
2. Wie kan donor worden?	3
3. Verwachtingen van een donor	4
4. Risico's voor de donor	4
5. Hoe kan ik donor worden?	5
6. Vergoeding?	5
7. Anonimiteit	6

01 WAT IS EEN EICELBANK?

Net zoals zaadcellen kunnen nu ook eicellen ingevroren en bewaard worden in een eicelbank. De eicellen uit de eicelbank kunnen gedoneerd worden aan vrouwen die zelf geen eicellen meer hebben of hun eicellen niet kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een genetisch probleem.

Sommige vrouwen gaan zeer vroeg (voor de leeftijd van 40 jaar) in de menopauze, anderen hebben hun eicellen verloren door kanker of een medische behandeling. Door deze gedoneerde eicellen te bevruchten via ICSI met het zaad van hun eigen partner (of donorzaad) kunnen deze vrouwen toch zwanger worden. Er is veel vraag naar eiceldonatie, maar eicellen zijn spijtig genoeg schaars.

02 WIE KAN DONOR WORDEN?

Jonge vrouwen tussen 24 en 35 jaar die al dan niet hun kindervens vervuld hebben, kunnen zich kandidaat stellen om donor te worden. Het doneren van eicellen is ingrijpender dan het doneren van zaadcellen. De procedure neemt een aantal weken in beslag en kan voor lichamelijk ongemak zorgen. Eiceldonoren moeten dan ook sterk gemotiveerd zijn. Er is daarom een groot tekort aan eiceldonoren.

In ons centrum passen wij zowel anonieme als gekende (enkel zus-zus of nicht-nicht) donatie toe. Anonieme donatie kan op twee manieren. Een eerste optie is een vrijwillige anonieme donatie. Het kan echter ook voorkomen dat een bevriend koppel met vruchtbaarheidsproblemen je heeft aangesproken om eicellen te doneren. Door jouw eicellen anoniem af te staan aan iemand anders, krijgt dat bevriend koppel andere eicellen uit de eicelbank zonder wachttijd. Dit noemen we kruisdonatie en is dus de tweede optie bij anonieme donatie. Zoals eerder aangehaald, kunnen enkel zussen (of nichten) onderling aan gekende donatie doen.

03 VERWACHTINGEN VAN EEN DONOR

Vooraleer een vrouw eiceldonor kan worden, moet zij een gynaecologisch onderzoek en een bloedafname ondergaan om infecties en bepaalde genetische aandoeningen uit te sluiten. Ook wordt een gesprek gevoerd met een fertiliteitsconsulente, een specialist in de genetica en een psychologe voordat de procedure kan starten. De resultaten van de genetische screening duurt enkele weken tot maanden.

Indien alle onderzoeken normaal zijn, kan de hormonale stimulatie van de eierstokken starten. Dit gebeurt door onderhuidse injecties en duurt min of meer 2 weken, waarna de eicellen rijp genoeg zijn om verzameld te worden via eicelaspiratie (pick-up). De opvolging van de hormonale stimulatie bestaat uit een aantal echo's en bloedafnames op geregelde tijdstippen. Het verzamelen van de eicellen is een lichte ingreep die plaatsvindt onder sedatie (een licht algemene verdoving).

04 RISICO'S VOOR DE DONOR

De hormonale stimulatie en de groei van de eierstokken kan een tijdelijk ongemak geven met opzetting van de buik. Heel zelden komt het voor dat de eierstokken te veel follikels (eiblaasjes) aanmaken (ovariële hyperstimulatie). Met de huidige manier van hormonale stimulatie worden ernstige gevolgen zoals een ziekenhuisopname quasi altijd vermeden.

Het verzamelen van de eicellen kan uiterst zeldzaam een inwendige ontsteking of een bloeding veroorzaken. Alles wordt in het werk gesteld om dit te vermijden maar een eicelpick-up blijft een ingreep met mogelijke complicaties.

Een donor kan natuurlijk ook zwanger worden als ze geen adequate voorbehoedsmiddelen gebruikt tijdens de behandeling. Om ongewenste zwangerschappen te vermijden wordt het aangeraden zich te onthouden van onbeschermde gemeenschap tijdens de behandeling tot enkele dagen na de eicelpick-up.

05 HOE KAN IK DONOR WORDEN?

Indien u interesse heeft om eiceldonor te worden, kunt u een aanmeldingsformulier invullen via onze website www.zol.be/fertiliteitscentrum (menubalk 'Eiceldonatie').

Wij contacteren u dan om een eerste afspraak te maken. U kan ook bellen voor meer informatie met onze consulente (Tel. 089 32 77 22 tussen 10 en 15.30 uur tijdens werkdagen).

06 VERGOEDING?

Een anonieme donor krijgt voor elke donatie een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Deze vergoeding zal u verkrijgen na de donatie. Uitrijkaartjes voor de parking worden voorzien. Alle medische kosten van screening en donatie zullen gedragen worden door het fertiliteitscentrum of door uw mutualiteit. Als donor dient u niets te betalen in dit hele traject.

07 ANONIMITEIT

Indien u geselecteerd wordt voor anonieme eiceldonatie, zal u als donor geen aanspraak kunnen maken op enige informatie omtrent uw donatie. Er wordt gewerkt met een uniek donornummer en de medewerkers van de eicelbank zijn gebonden aan een strikt beroepsgeheim. Hierdoor wordt absolute anonimiteit voor, tijdens en na donatie gewaarborgd door het fertiliteitscentrum. De wensouders die een kind kregen via een anonieme eiceldonor kunnen geen aanspraak maken op het verkrijgen van de identiteit van de donor.

[illegible]



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be