

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Scheelzien (Strabisme)

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Het doel van de strabisme-operatie is om een cosmetisch rechte oogstand te bekomen. Bij de patiënten die dubbel zien is de operatie bedoeld om enkelzicht te bekomen, eventueel met behulp van een prisma nadien.

We wensen u een spoedig herstel.

Heeft u nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

INHOUDSTAFEL

1. Strabisme/scheelzien	3
1.1 De operatiedag	
1.2 De operatie	
1.3 Na de operatie	
1.4 Ten slotte	

01 STRABISME/ SCHEELZIEN

Wanneer één van de ogen naar de neus, naar buiten, naar boven of naar beneden staat, noemen we dit scheelzien.

Scheelzien dat op jonge leeftijd ontstaat, gaat vaak gepaard met slecht zicht aan het wegdraaiende oog (= lui oog of amblyopie). Bij scheelzien dat op latere leeftijd ontstaat, ziet de patiënt soms dubbel of kan hoofdpijn ontstaan.

Eerst wordt geprobeerd om het zicht in beide ogen even goed te krijgen door middel van een bril en/of het afplakken van het beste oog gedurende een paar uur per dag.

Bepaalde vormen van scheelzien kunnen met een bril verholpen worden. Zoniet wordt een scheelzienoperatie gepland.

Te verwachten resultaten van de operatie

- De behandelende oogarts bespreekt met u welk resultaat u mag verwachten. Dit verschilt per persoon. Tijdens de eerste weken tot maanden na de operatie kan de oogstand nog veranderen. Na twee tot

drie maanden kan meestal het uiteindelijke resultaat beoordeeld worden.

Bij een scheelzienoperatie bestaat een kans op over- of ondercorrectie. In deze gevallen is er mogelijk nog een operatie nodig.

- De operatie aan de oogspier heeft geen invloed op de brilsterkte en/of gezichtsscherpte.
- Er bestaat een geringe kans op dubbelzien na de operatie. Dubbelzien verdwijnt meestal vanzelf binnen twee weken. Soms is de gezichtsscherpte na de operatie wat verminderd. Dit is in de meeste gevallen van tijdelijke aard.

1.1 De operatiedag

De ingreep zal doorgaan in het ZOL, op campus Sint-Barbara in Lanaken. Voor het juiste tijdstip mag u de dag voordien naar het **Dagziekenhuis van Sint-Barbara** in Lanaken telefoneren op 089 32 51 12.

Wanneer uw operatie op een maandag valt, dient u al de vrijdag ervoor te bellen, dit telkens tussen 14 en 16 uur.

De ingreep verloopt onder algemene verdoving. U moet vóór de operatie nuchter zijn om braken en longproblemen tijdens en na de operatie te voorkomen. Dit betekent dat u minstens 7uur vóór de operatie niet meer mag eten. Heldere, niet-bruisende dranken (water, Aquarius, thee ZONDER melk) mogen nog gedronken worden tot 4 uur vóór de operatie. Vanaf dan mag u niet meer drinken. Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis kan het zijn dat de anesthesist een ander advies zal geven. Dit advies dient u dan te volgen.

Wanneer u bloedverdunners neemt, overlegt u best op voorhand met uw arts of deze moeten stopgezet worden. Andere medicijnen mogen op de dag van de operatie ingenomen worden met een beetje water.

Op de dagkliniek wordt u voorbereid op de operatie. U krijgt operatiekleding aan en een verpleegkundige brengt u naar de operatieafdeling. Op de voorbereidingskamer wordt uw verdoving gegeven.

Na de operatie mag u in de loop van de namiddag het ziekenhuis verlaten.

1.2 De operatie

Tijdens de operatie worden de oogspieren, die vastzitten aan de oogbol, verplaatst. Welke spieren verplaatst worden, wordt bepaald aan de hand van de oogstand, de beweeglijkheid van de ogen en de eventueel eerdere scheelzienoperatie.

De operatie gebeurt in dagbehandeling. U hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten. De behandelende oogarts bespreekt met u of u aan één of aan beide ogen geopereerd moet worden.

1.3 Na de operatie

Na de operatie is het oogwit rood op de plaats waar geopereerd is. Vooral de dag na de operatie kan het oogwit flink rood en gevoelig zijn. Dit kan een paar dagen aanhouden. De avond na de operatie moet u zelf in beide ogen doen.

Vanaf de dag na de operatie druppelt u 3x/dag met Tobradex en voor het slapen gaan gebruikt u Tobradex oogzalf.

De volgende dagen zal u mogelijk wat lichtschuw zijn en kan de oogstand nog wat wisselend zijn. Zwembad en zandbak worden best vermeden zolang de ogen rood zijn.

Bij pijn mag u gewone pijnstillers nemen, best geen aspirines, omwille van het risico op nabloedingen.

De controles na de operatie zullen u meegedeeld worden.

Veel mensen hebben dorst na een operatie. Na de meeste operaties zal u snel na de ingreep weer mogen drinken en starten met lichte voeding. Na een aantal operaties is het noodzakelijk om langer nuchter te blijven. Als u wat mag drinken, doe het voorzichtig aan. Mag u niet drinken, dan kan de verpleegkundige uw lippen nat maken om het u zo comfortabel mogelijk te maken.

1.4 Ten slotte

In deze folder vindt u belangrijke informatie over een strabisme. Mocht u vragen hebben, verzoecken wij u om ons te contacteren.

1.5 Contact

www.zol.be/oogziekten

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be