

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Histamine provocatietest

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

WELKOM

U vernam van uw arts dat u een histamine provocatietest moet ondergaan. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende geneesheer en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: prof. dr. D. Ruttens
(Pneumoloog) | Mei 2024

INHOUDSTAFEL

1. Histamine provocatietest	3
1.1 De voorbereiding	
1.2 Verloop van het onderzoek	
2. Vragen?	8

01 HISTAMINE PROVOCATIETEST

Dit is een onderzoek om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen, zoals gezien wordt bij astma, op te sporen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een lichaamseigen stof. De stof kan een luchtwegirritatie uitlokken bij mensen met overgevoelige luchtwegen, terwijl het bij andere mensen geen noemenswaardige reactie geeft.

1.1 De voorbereiding

U mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent. U hoeft niet nuchter te zijn.

Voor het goed slagen van de test dient u op voorhand te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen, zoals de meeste inhalatiemedicijnen ('puffers'). In onderstaande lijst vindt u de medicatie op naam en het aantal uur dat u deze dient te stoppen voor het onderzoek.

1.1.1 Medicatie te stoppen bij Histamine provocatietest

Merknaam	Aantal uur te stoppen vóór het onderzoek
Aerius	48u
Aerinaze	48u
Allegratab	48u
Atarax	48u
Bellozal	48u
Cetirizine	48u
Cirrus	48u
Clarinase	48u
Combivent	8u
Desloratidine	48u
Duovent	8u
Ebastine	48u
Estivan	48u
Foradil	48u
Fenistil	48u
Ilexel	48u
Inuvair	48u

Merknaam	Aantal uur te stoppen vóór het onderzoek
Levocetirizine	48u
Loratadine	48u
Mizollen	48u
Relvar	48u
Rhinathiol Antirhi-	48u
Rhinosinutab	48u
Rhinofebryl	48u
Rupatadine	48u
Rupatall	48u
Seretide	48u
Spiriva	48u
Symbicort	48u
Telfast	48u
Ventolin	8u
Xyzall	48u
Zatiden	48u
Zyrtec	48u

1.2 Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel. U krijgt een knijpertje op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Er wordt een longfunctietest afgenomen, waarbij de longfunctie-assistent(e) u enkele malen zal vragen diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.

Daarna gaat u via een aerosol-apparaat een histamine-oplossing inademen, waarna opnieuw de longfunctie wordt gemeten. Dit wordt meerdere malen herhaald, telkens met een hogere concentratie histamine.

Aan de hand van de meetresultaten en het eventuele optreden van reacties (kortademigheid, hoes-ten, piepen) kan worden vastgesteld of uw luchtwegen overgevoelig zijn, alsook hoe ernstig deze overgevoeligheid is.

Dreigt een reactie te hevig te worden, dan wordt tijdig ingegrepen. Het onderzoek wordt dan gestopt, u krijgt onmiddellijk een luchtweg-verwijder toegediend, waardoor de reactie in het algemeen ongedaan wordt gemaakt. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een luchtwegverwijder.

Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunctie weer helemaal normaal is geworden. Het totale onderzoek kan tot maximaal één uur in beslag nemen. U kunt een lichte vorm van benauwdheid tijdens het onderzoek ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft ingeademd.

Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is soms vermoeiend vanwege het vele blazen, maar is niet gevaarlijk.

02 VRAGEN?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de raadpleging Pneumologie. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 089 80 82 62 of via pneumologie@zol.be.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be