

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont

ZOL MAAS EN KEMPEN



Huidallergietest

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 32 50 50
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

WELKOM

Via deze brochure willen we u informeren over de huidallergietest.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

INHOUDSTAFEL

1. Huidallergietest

- 1.1 Voorbereiding
- 1.2 Het onderzoek
- 1.3 Bijwerkingen van de test

2. Vragen?

Inhoudsverantwoordelijke: dr. M. Thomeer (Pneumoloog) | Juli 2019

01 HUIDALLER- GIETEST

Deze test heeft als doel een allergische reactie op te sporen op een allergeen. Allergenen zijn stoffen waar je overgevoelig op kunt reageren; dit kunnen allergenen zijn via de lucht of via de voeding.

1.1 Voorbereiding

- Sommige medicijnen mag u 7 dagen voor de priktest niet innemen. Dit gaat over de groep van de antihistaminica (medicijnen die een allergische reactie verminderen). Voorbeelden zijn cetirizine, Xyzall, Zyrtec, Alerius, Estivan, Bellozal,... Ook cortisonemedicijnen moeten gestopt worden om een goede test te kunnen doen. Inhalatiemedicatie ('puffers') hoeven niet gestopt te worden.
- Als u twijfelt of uw medicijn al dan niet gestopt moet worden, vraagt u best raad aan uw arts.
- Lokale behandeling van de huid van de armen met cortisone-zalven mag niet gebeuren in de laatste 3 dagen voor onderzoek.

1.2 Het onderzoek

Bij deze test worden kleine druppeltjes van verschillende allergenextracten aangebracht op de onderarm. Met een naaldje prikt men door het druppeltje oppervlakkig in de huid. Dit kan soms een onaangenaam gevoel geven, maar is niet echt pijnlijk.

Na 15 minuten wordt afgelezen of het lichaam gereageerd heeft. Bij een allergische reactie zal een kleine rode zwelling ('kwaddel') op de huid ontstaan dat kan jeuken.

1.3 Bijwerkingen

Het kan zijn dat de huidreacties meteen na het onderzoek gaan jeuken. Een lokaal jeukwerende crème kan dan worden aangebracht.

Een ernstige allergische reactie komt zeer zelden voor. U kan dit herkennen aan een uitbreidende roodheid en zwelling, benauwdheid en koorts.

Deze reacties verschijnen binnen

02 VRAGEN?

de 6 uur na het onderzoek. Als dit zou gebeuren, neemt u best contact met uw arts op.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de raadpleging pneumologie. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur via 089 32 71 71, pneumologie@zol.be.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be