

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Maviret® Glecaprevir + Pibrentasvir

Product Informatie Fiche

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Via deze brochure willen we u informeren over het gebruik van Maviret.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel niet om uw arts te contacteren.

INHOUDSTAFEL

1. Maviret

- 1.1 Therapeutisch gebruik
- 1.2 Wijze van toediening
- 1.3 Mogelijke bijwerking
- 1.4 Interacties met andere geneesmiddelen
- 1.5 Bewaring
- 1.6 Andere aanbevelingen

Inhoudsverantwoordelijke: M. Stragier (Hoofdapotheker) | Augustus 2018

01 MAVIRET®

Maviret® tablet 400mg/40mg
(roze, langwerpig, aan beide zijden bol)



1.1 Therapeutisch gebruik

Maviret® wordt gebruikt als behandeling van een chronische infectie met het hepatitis C-virus bij volwassen patiënten.

1.2 Wijze van toediening

Wat is de aanbevolen dosis ?

De aanbevolen dosis is drie tabletten éénmaal per dag gedurende weken. Slik de tabletten in hun geheel in tijdens de maaltijd of met een snack, steeds op hetzelfde moment van de dag (ochtend/middag/avond). De tabletten dienen niet gekauwd, gebroken of geplet te worden.

Wat als u moet braken na inname van een dosis ?

- Als u binnen **3 uur na inname** braakt, moet een **nieuwe**

dosis (3 tabletten) worden ingenomen.

- Als u **meer dan 3 uur na inname** braakt, is een **extra dosis niet nodig**.

Wat als u een dosis vergeten in te nemen bent ?

Het is zeer belangrijk dat u geen dosis overslaat omdat dit het succes van de behandeling doet dalen. Als u toch een dosis vergeten in te nemen bent, ga dan na hoe lang het geleden is dat u Maviret voor het laatst hebt ingenomen:

- Als u dit ontdekt **binnen 18 uur** na het tijdstip waarop u het geneesmiddel gewoonlijk inneemt, moet u zo spoedig mogelijk een **nieuwe dosis** (3 tabletten) innemen. Neem daarna de volgende dosis op het voor u gebruikelijke tijdstip.
- Als er **meer dan 18 uur** verstreken is na het tijdstip waarop u het geneesmiddel gewoonlijk inneemt, wacht dan en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in. **Neem geen dubbele dosis in!**

Stop niet zomaar met het innemen van dit geneesmiddel, maar bespreek dit eerst met uw arts.

Inname met een groot glas water en zonder kauwen.

1.3 Mogelijke bijwerking

Er zijn geen ernstige nevenwerkingen van Maviret® gemeld.

Mogelijk zijn:

- vermoeidheid
- misselijkheid
- hoofdpijn
- slapeloosheid

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

1.4 Interacties met andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Maviret® beïnvloeden.

Informeer uw arts over alle andere (homeopathische) geneesmiddelen of supplementen die u inneemt, zodat uw volledig medicatieschema kan nagezien worden.

1.5 Bewaring

Op kamertemperatuur, op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

1.6 Andere aanbevelingen

Vrouwen in de vruchtbare leeftijd zullen een zwangerschap vermijden tijdens hun behandeling.

Bron:

Bijsluiter Maviret®

Samenvatting productkenmerken

Info AbbVie

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be