

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Behandelen met Vedolizumab

merknaam Entyvio®

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Vedolizumab (Entyvio).

In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of IBD-verpleegkundige terecht.

INHOUDSTAFEL

1. Algemeen	3
2. Opstarten met Vedolizumab	3
2.1 Vooronderzoeken	
2.2 Informeer uw IBD-verpleegkundige of behandelende arts	
3. Toedieningswijze	5
4. Controles	6
5. Bijwerkingen	7
6. Zwangerschap en borstvoeding	8
7. Aandachtspunten	8
8. Vaccinaties	9
9. Tot slot	10
9.1 Nuttige telefoonnummers	

01 ALGEMEEN

Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot een vermindering van de klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte kunnen voordoen.

De ziekte geneest niet door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met deze medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

02 OPSTARTEN MET VEDOLIZUMAB

Uw behandelende arts schrijft Vedolizumab voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen.

Bij patiënten met Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn wordt een verhoogde ontstekingsreactie gezien in de darm door een nog onbekende oorzaak. Bij deze ontstekingsreactie spelen witte bloedcellen een grote rol. Vedolizumab is een antilichaam dat bindt aan een darmspecifiek eiwit (het $\alpha 4\beta 7$ -integrine) dat alleen op de witte bloedcellen wordt aangetroffen. Door deze binding wordt verhinderd dat witte bloedcellen uit de bloedvaten naar de darm migreren, zodat de ontsteking in de darm afneemt. Hierdoor werkt Vedolizumab selectief op de darmen.

Vedolizumab kan in combinatie met andere medicijnen worden voorgeschreven.

Na start van Vedolizumab kan het tot 14 weken duren voordat het effect van Vedolizumab merkbaar is. Over het algemeen is het effect

bij Colitis Ulcerosa eerder merkbaar dan bij de ziekte van Crohn.

2.1 Vooronderzoeken

Voordat u start met dit medicament is het belangrijk om eventuele sluimerende infecties uit te sluiten, zoals oa. tuberculose (TBC) en hepatitis (besmettelijke leverontsteking).

U kan tuberculose en hepatitis meedragen zonder dat u hier klachten van hebt. Het gebruik van dit medicament kan er namelijk toe leiden dat de infectie opnieuw actief wordt.

Daarom wordt bij alle patiënten een **huidtest (Mantouxtest voor TBC), bloedafname en een röntgenfoto van de longen verricht voor de start van de medicatie.**

2.2 Informeer uw IBD-verpleegkundige of behandelende arts

indien er sprake is van één of meer van onderstaande omstandigheden:

- Een koortsprobleem (gemeten temperatuur > 38°C)
- Een infectie op één plaats in uw lichaam (zoals een zweer op uw been).
- Een infectie in uw hele lichaam (zoals griep).
- Een langdurige of steeds terugkerende infectie.
- Zware verkoudheid.
- Gebruik van medicatie.
- Verschijnselen van een allergische reactie (overgevoelighed).

Als u deze verschijnselen heeft tijdens uw behandeling, wacht dan met uw medicatie te bestellen maar neem contact op met de IBD-verpleegkundige, uw behandelende arts of de arts van wacht. Zo kan eventueel op advies uw behandeling in pauze gezet worden en op een later tijdstip herstart worden.

Stop nooit zelf uw medicatie maar altijd na overleg met uw behandelend arts of IBD-verpleegkundige!

03 TOEDIENINGS- WIJZE

Vedolizumab wordt via een infuus in de bloedbaan gegeven in onze dagkliniek. Bij opstarten van de behandeling krijgt u een infuus op **week 0, 2 en 6, vanaf week 14 krijgt u een infuus om de 8 weken**. Als u de ziekte van Crohn heeft, heeft u nog recht op een extra infuus in week 10.

Het medicijn loopt gedurende een periode van **30 minuten** in. Bij ieder infuus krijgt u 300 mg Vedolizumab toegediend, deze dosering is steeds hetzelfde en onafhankelijk van uw gewicht.

U hoeft niet nuchter te zijn tijdens de behandeling. In normale omstandigheden kan u na de behandeling zelf naar huis rijden. Idealiter brengt u de eerste keer van de behandelingen iemand mee om u te begeleiden, mocht u zich moe of onwel voelen. Tijdens het inlopen van het infuus mag u de afdeling **niet** verlaten omdat de verpleegkundige u steeds moet kunnen observeren.

Om uw wachttijd in de dagkliniek te verkorten, vragen we u om de medicatie te bestellen in de

ochtend van uw toediening via het nummer van de dagkliniek **089 80 83 40**. Dit op voorwaarde dat u **geen** specifieke lichamelijke klachten, tekens van infectie of koorts heeft. Indien u een van deze klachten zou ervaren, dient u eerst contact op te nemen met uw behandelende arts, alvorens de medicatie te bestellen.

Indien u **ziek** bent of niet op uw afspraak kunt komen, dan **meldt u zich best één dag van te voren telefonisch af bij de dagkliniek!** In uw plaats kunnen wij dan iemand anders helpen.

COLITIS ULCEROSA



ZIEKTE VAN CROHN



Bij een goede respons op het infuus, kunt u in samenspraak met uw behandelend arts overschakelen naar een subcutane injectie (pen/spuit) **om de 2 weken**.

04 CONTROLES

Zo kunt u de behandeling met Vedolizumab zelf thuis voortzetten. De IBD-verpleegkundige leert u de eerste injectie (pen/spuit) zelf toedienen. Deze injectie brengt u mee van thuis in de daarvoor voorziene koeltas, die u krijgt van de IBD-verpleegkundige. Indien u de injectie niet zelf wilt toedienen kunt u altijd beroep doen op een thuisverpleegkundige.

Waar kan u de injectie plaatsen



Voor een veilig verloop van uw behandeling is het noodzakelijk dat u zich houdt aan de afspraken die met u worden gemaakt. Ook is het noodzakelijk om regelmatig bloedonderzoek te laten doen. Soms wordt er ook een controle endoscopie gepland.

Deze controles zijn nodig om het effect van de behandeling met Vedolizumab te kunnen opvolgen.

05 BIJWERKINGEN

Zoals bij alle geneesmiddelen, kan ook het gebruik van Vedolizumab bijwerkingen geven. Let wel, niet iedereen ondervindt deze bijwerkingen.

Klinische studies hebben de veiligheid en werkzaamheid van Vedolizumab onderzocht. Ze toonden een zeer laag niveau van bijwerkingen aan.

Bijwerkingen die kunnen optreden tijdens de toediening

Overgevoeligheidsreacties als gevolg van het infuus. Uw lichaam kan schrikken doordat het in korte tijd een kwart liter extra volume in de bloedbaan krijgt. Dit kan zich uiten door schommelingen in de bloeddruk. De verpleegkundige controleert daarom uw bloeddruk. Ook pijn en irritatie op de infuusplaats, koude rillingen en een koud gevoel zijn bijwerkingen die tijdens of vlak na het infuus kunnen optreden. Infusiereacties met Vedolizumab zijn zeldzaam.

Mogelijke bijwerkingen na uw behandeling

Verkoudheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, koorts door infecties, rugpijn, jeuk en huiduitslag. Bij injecties een injectieplaatsreactie waaronder roodheid, zwelling, pijn of jeuk.

Bij iedere mogelijke bijwerking dient u contact op te nemen met uw behandelende arts of IBD-verpleegkundige.

De volledige lijst met bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

06 ZWANGERSCHAP EN BORST- VOEDING

Als u zwanger wilt worden of borstvoeding wilt geven terwijl u Vedolizumab gebruikt, raadpleeg dan vooraf uw behandelende arts voor meer informatie. Stop nooit op eigen initiatief uw behandeling.

07 AANDACHTS- PUNTEN

- Laat uw behandelende arts weten als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Breng de arts of tandarts die de ingreep uitvoert op de hoogte dat u een behandeling met Vedolizumab volgt.
- U mag **NOOIT** een dubbele dosis Vedolizumab injectie toedienen.
- Wanneer u een injectie bent vergeten, zult u de eerste volgende injectie moeten toedienen van zodra u het zich weer herinnert. De daarop volgende injectie zult u moeten toedienen na 2 weken. Bij twijfel raadpleeg u IBD-verpleegkundige.
- Bewaar Vedolizumabinjecties buiten het zicht en bereik van kinderen, in de koelkast bij een temperatuur tussen 2°C en 8°C, in de originele verpakking.
- Bestel minstens 2 weken op voorhand uw injecties bij de thuisapotheek. Deze liggen niet op voorraad!

08 VACCINATIES

- Vergeet u reiscertificaat niet aan te vragen bij uw behandelend arts of IBD-verpleegkundige.
- Enkel uw behandelde arts kan een voorschrift maken voor de subcutane injecties.

De internationale (volgens ECCO) en nationale (BIRD) richtlijnen adviseren om onder een behandeling met Vedolizumab u zo goed mogelijk te vaccineren tegen mogelijke infecties.

Uw behandelend arts en IBD-verpleegkundige zullen u hierover verdere toelichting geven.

De meeste vaccinaties bestaan uit niet-levende micro-organismen en mogen zonder problemen uitgevoerd worden onder deze behandeling. Dit zijn bijvoorbeeld het griepvaccin, het pneumococcenvaccin (longontsteking), vaccinatie tegen hepatitis A en B (geelzucht)...

Er zijn een aantal vaccins die **levende of verzwakte micro-organismen** bevatten zoals o.a. het vaccin tegen **Gele Koorts** (bij tropische reizen), het vaccin tegen **mazelen, bof, rubella** en het vaccin tegen **varicella** (=wind-/waterpokken).

09 TOT SLOT

Deze **mogen NIET gecombineerd worden met een immuunonderdrukkende behandeling**. Als u toch een levend, verzwakt vaccin nodig heeft, raadpleeg dan eerst uw behandelende arts of uw IBD-verpleegkundige.

Neem bij vragen of problemen contact op met uw IBD-verpleegkundige. Dit kan bij voorkeur via mail. Vermeld altijd uw naam, voornaam en geboortedatum in uw bericht. Op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag is het ook mogelijk om telefonisch contact te nemen.

Wilt u eerder uw behandelende arts spreken, contacteer dan de IBD-verpleegkundige of de raadpleging Gastro-enterologie. Zij overleggen met uw behandelend arts en u wordt nadien opnieuw gecontacteerd.

Bij dringende problemen, kan u zich ook altijd wenden tot de Gastro-Enteroloog van wacht.

9.1 Nuttige telefoonnummers

- **IBD-Verpleegkundige:** tel. 089/80 73 35 of ibd.nurse@zol.be
- **Raadpleging** Gastro-Enterologie: tel. 089/80 73 30

Gastro-Enteroloog van wacht via algemeen nummer Van het ZOL:

tel. 089/80 80 80

- **Dagkliniek Geneeskunde:**
tel. 089 80 83 40
- **Psychologe:** tel. 089/32 56 91
- **Diëtiste:** tel. 089/80 68 21
- **Dienst Patiëntenbegeleiding:**
tel. 089/80 68 59

Deze folder wordt u aangeboden door de gastro-enterologen van het ZOL.

Wij hopen met deze folder en de diensten van de IBD-verpleegkundige u meer inzicht te geven in uw ziekte en de behandeling.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be