

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Emla®

Toverzalf

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste ouder(s),
Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat er bij u EMLA zelf aangebracht wordt als lokale verdoving van de huid. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is EMLA®?	3
1.1 Wanneer wordt EMLA® gebruikt?	
1.2 Hoe EMLA® gebruiken?	
1.3 EMLA® aanbrengen	
1.4 Gebruiksaanwijzing	

01 WAT IS EMLA®?

EMLA® staat voor Eutectic Mixture Lidocaïne and Prilocaine. Lidocaïne en Prilocaine zijn de 2 werkzame stoffen in deze crème die er voor zorgen dat er een lokale verdoving van de huid ontstaat, op de plaats waar de crème werd aangebracht. Uw kind gaat nagenoeg geen pijn meer voelen.

EMLA® is verkrijgbaar in een tube van 5mg of in kant-en-klare vorm door middel van een pleister waar reeds EMLA® op aangebracht werd. Het kan voor alle leeftijden gebruikt worden.

1.1 Wanneer wordt EMLA® gebruikt ?

EMLA® is een geneesmiddel en wordt door de apotheek afgeleverd volgens een medisch voorschrift.

EMLA® kan gebruikt worden voorafgaande aan een bloedafname, infuus prikken, intradermale inspuiting, lumbale punctie,... EMLA® mag nooit gebruikt worden op plaatsen waar de huidbarrière beschadigd is. Dus niet op een open wonde.

1.2 Hoe EMLA® gebruiken?

- De arts of verpleegkundige zal aangeven waar u de crème moet aanbrengen.
- Gebruik niet meer EMLA® dan voorgeschreven werd door de arts.
- Wanneer u de crème heeft aangebracht uit een tube, wordt hierop nog een occlusieve pleister (= volledig afgesloten van de lucht) aangebracht.
- Nadien windelt u het lichaamsdeel, waar de crème op aangebracht werd, in. Zo verhindert u het accidenteel loskomen van de pleister. Laat de pleister minstens 1 uur maar niet langer dan 4 uur zitten.
- De crème moet afgeschermd worden van de lucht, anders verliest de crème het verdovend effect.

1.3 EMLA® aanbrengen

- Meld datum en tijdstip op de aangebrachte pleister.

Dag:

Tijdstip:

1.4 Gebruiksaanwijzing

Crème

1. Was uw handen en droog ze af.
2. Breng EMLA® crème aan op de plaats die de arts/verpleegkundige met u heeft afgesproken zonder deze aan te raken met uw vingers.
3. Breng de pleister aan (volledig afsluiten van omgevingslucht).
4. Druk de pleister aan de buitentzijde aan, niet op de zalf duwen!
5. Windel het lichaamsdeel waarop EMLA® aangebracht werd in met verband.

Patch

Er kan ook een EMLA® patch gebruikt worden. Het aanbrengen is eenvoudiger omdat de zalf reeds op een pleister werd aangebracht. Na het bevestigen van de pleister brengt u ook een verband aan ter hoogte van de patch. Zo kan er geen omgevingslucht met de zalf in aanraking komen.

Verwijderen van bescherm-laag EMLA® patch, aangebracht op elleboogplooi (kan ook op handrug gebruikt worden).

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be