

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Subcutane of onderhuidse inspuiting van clexane

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

U vernam van uw arts dat u inspuitingen met Clexane moet krijgen. Deze brochure geeft u meer informatie over deze procedure en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: prof. dr. P. Vaneldereren
(Anesthesist) | Mei 2022


INHOUDSTAFEL

1. Een subcutane of onderhuidse inspuiting van clexane	3
1.1 Benodigdheden	
1.2 Plaatsbepaling	
1.3 Toediening inspuiting	
1.4 Nazorg	

01 EEN SUBCUTANE OF ONDERHUIDSE INSPUITING VAN CLEXANE

Clexane is een antistollingsmedicijn. Dit stop de groei van bestaande bloedstolsels en voorkomt de vorming van nieuwe bloedstolsels.

De voorkeursplaats voor de inspuiting is in het onderhuids weefsel van de buik, als dit niet mogelijk is kan Clexane ook toegediend worden in een huidplooi aan de bovenzijde van het bovenbeen.



1.1 Benodigdheden

Voor je begint controleer altijd eerst de houdbaarheidsdatum van het geneesmiddel.

Probeer Clexane elke dag rond hetzelfde tijdstip toe te dienen.

Benodigdheden:

- Clexane
- Alcoholdoekje (ontsmetten van de huid) of water en zeep
- Naaldcontainer of doosje waar je naderhand de spuit in kunt opbergen.



1.2 Plaatsbepaling

- De voorkeursplaats is de buik, 5cm van de navel. Niet dichters owv de slechte opname van dit product in deze regio.
- Wissel bij elke inspuiting van injectieplaats (linkerzijde – rechterzijde).
- *!! Controleer voor injectie de huid. Er mag niet geïnjecteerd worden in een wonde, abces, blauwe plek, irritatie of littekens!!*

1.3 Toediening inspuiting

- Zorg voor een comfortabele houding, zodat u ontspannen bent.
- Maak de huid zuiver waar je gaat injecteren met alcoholdoekje of water en zeep.
- Verwijder het bescherm dopje van de spuit
- De spuit is gebruiksklaar, de luchtbel NIET verwijderen

Een brede huidplooi nemen tussen duim en wijsvinger en deze huidplooi optillen zonder te knijpen.



De naald loodrecht in het midden van de huidplooi inbrengen. De huidplooi blijven fixeren. Duw de stamper rustig naar beneden zodat de volledige vloeistof en luchtbel zijn geïnjecteerd.

Na de inspuiting de naald loodrecht verwijderen en dan pas de huidplooi loslaten.

1.4 Nazorg

- Het is mogelijk dat er een druppel bloed vrijkomt, maar meestal is er geen pleister nodig.
- Wrijf na de inspuiting niet op de injectieplaats of masseer ze niet. Dit kan blauwe blekken veroorzaken.
- Verwijder de spuit veilig in de naaldcontainer of voorziene doosje. Dit kan naderhand worden afgeleverd bij de apotheek.

NOTITIES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be