

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Sacro-iliacaal gewricht

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel. +32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Deze brochure geeft u meer informatie over de behandeling van een sacro-iliacaal gewricht en tracht op een aantal veel gestelde vragen antwoord te geven.


Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelende arts en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. De behandeling
2. Tips
3. Uw afspraak

De arts heeft u een voorstel gedaan om uw sacro-iliacaal gewricht te behandelen. U heeft pijn in de onderrug, meestal aan één kant en deze straalt uit tot in de bilregio. Soms ondervindt u ook een uitstraling tot in het bovenbeen, maar meestal niet voorbij de knie. Er kan tevens sprake zijn van liespijn. Lopen kan moeilijk gaan. Staan, zitten en trappen opstappen geeft meestal verergering van pijn.

De SI gewrichten (bekkengewrichten) liggen tussen het heiligbeen en het bekken. De gewrichtjes bevinden zich onderin de rug, aan weerskanten van de wervelkolom.



1. De behandeling

De behandeling vindt plaats in de Dagklinische ingrepenzaal (DIZ3) in Maaseik. Onder röntgendoorlichting wordt het gewricht opgezocht en gemarkeerd met een stift.

Na een plaatselijke huidverdooving en het steriel afdekken van de prikplaats, gaat de arts een klein naaldje plaatsen ter hoogte van het gewricht. Vervolgens testen we de juiste plaats met een contrastvloeistof (zichtbaar onder scopie) vooraleer we cortisone inspuiten.

De infiltratie van cortisone (= een ontstekingsremmend en pijnstillend medicament) heeft als hoofddoel de pijn te minderen. Iedere medicatie kan een allergische reactie uitlokken. Dan ontstaat er ter hoogte van de prikplaats een lichte roodheid, zwelling en kan deze wat gevoelig

zijn. Deze symptomen verdwijnen na enkele dagen.

Indien deze reacties extreem hevig en uitgesproken zijn, gelieve uw huisarts te contacteren. Door de behandeling met cortisone dienen diabetespatiënten hun bloedsuikerwaardes iets meer te controleren want die kunnen verhoogd zijn.

Een vermindering van pijn treedt op vanaf ongeveer de derde dag. Op de consultatie na vier weken zou u moeten kunnen vertellen of de pijn weg is, enkele uren beter was of dat u helemaal geen resultaat heeft ondervonden.

2. Tips

- U hoeft niet nuchter te zijn.
- Indien u ziek bent, koorts heeft op de dag van behandeling, of niet aanwezig kan zijn op de afspraak, gelieve dan contact op te nemen.
- Meld ons indien u bloedverdunders neemt. Sommige medicaties moeten op voorhand gestopt worden of vervangen worden door een ander geneesmiddel.
- Meld ons voor de start van de behandeling indien u allergisch bent aan jodium, contrastvloei-stof, kleurstof, latex, cortisone of andere producten.
- Meld ons indien u zwanger bent. We werken met röntgenstralen.
- De opname duurt ongeveer 2-3 uren.
- Het is voor u als patiënt aangenaam om een kamerjas mee te brengen die u kan aandoen van de afdeling naar de behandelkamer.
- Na de behandeling mag u geen voertuigen besturen (auto, moto, fiets) gedurende 24 uren.
- Neem geen belangrijke beslissingen en teken geen documenten de eerste 24 uren.
- Bij problemen gedurende de eerste 24 uren vb. koorts, krachtsvermindering in de benen of armen, hoofdpijn en nekstijfheid, ... contacteer uw huisarts of de dienst spoedgevallen van ZOL campus Maas en Kempen 089 50 60 00.

3. Uw afspraak

..... / /

..... uur

Artsen

- Dr. K. Lathouwers
- Dr. E. Geypen, algoloog
- Mevr. V. De Groote, verpleegkundig pijnspecialist

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be