


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Injectafer

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste patiënt,

Uw arts heeft u een behandeling met Injectafer voorgeschreven.

Deze brochure geeft u informatie over wat Injectafer is, hoe het werkt en welke nevenwerkingen er kunnen optreden bij deze behandeling.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige.

INHOUDSTAFEL

1. Wat is INJECTAFER	3
2. Behandeling	4
2.1 Voorbereiding	
2.2 Dag van toediening	
2.3 Toediening	
3. Mogelijke bijwerkingen	5
4. Contactgegevens	6

01 WAT IS INJECTAFER

Injectafer® is een geneesmiddel met een bruine kleur dat via een infuus wordt toegediend voor het behandelen van patiënten met een ijzergebrek wanneer oraal (via de mond) toegediende ijzerpreparaten niet werken of niet worden verdragen. Het doel van de behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam.

We halen ijzer uit voeding. Een evenwichtige, gevarieerde voeding die voldoende ijzerhoudende voedingsmiddelen (vlees, vis, gevogelte, granen en peulvruchten) en veel groenten en fruit bevat, kan in een adequate ijzerinname voorzien.

IJzer is essentieel voor ons lichaam, het is betrokken in tal van centrale processen in ons lichaam. De belangrijkste functie van ijzer is het zuurstoftransport doorheen ons lichaam: ijzer is de belangrijkste bouwstof van hemoglobine dat aanwezig is in de rode bloedcellen.

Zonder ijzer is zuurstoftransport doorheen ons lichaam niet mogelijk. IJzertekort kan aanleiding geven tot anemie (bloedarmoede).

02 BEHANDELING

Injectafer® is uitsluitend op voorschrift van de arts verkrijgbaar en zal gedurende een half uur toegediend worden op het dagziekenhuis geneeskunde en geriatrie (ZOL Genk) en dagziekenhuis inwendige en geriatrie (ZOL Maas en Kempen).

2.1 Voorbereiding

Voordat de behandeling met Injectafer® wordt gestart, zal de (huis)arts een bloedtest uitvoeren om de voor u benodigde dosis te bepalen, evenals de frequentie en de duur van uw behandeling.

Uw (huis)arts zal regelmatig uw ijzerparameters opvolgen, om het effect van de behandeling te meten en ijzerstapeling te voorkomen.

Breng voor de behandeling de arts op de hoogte over:

- Medicatie die u inneemt of tot voor kort innam
- Zwangerschap (of vermoeden van)
- Aanwezigheid van infectie
- Allergieën, voorgeschiedenis van ernstige astma, eczeem of andere atopische allergie,

immuun- of inflammatoire aandoening zoals bijvoorbeeld systemische lupus erythematoses, reumatoïde artritis. Bij deze patiënten is het risico op een allergische reactie groter.

2.2 Dag van toediening

Na de inschrijving zal u op de afdeling een relax zetel toegewezen waar de behandeling zal plaatsvinden.

Na een korte bevraging en het controleren van uw parameters (bloeddruk, temperatuur, hartslag) zal de verpleegkundige een infuus bij u prikken om Injectafer® te kunnen toedienen.

2.3 Toediening

Injectafer wordt via een ader toegediend.

Per week kan maximum 1g Injectafer® toegediend worden.

03 MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Overgevoelighedsreacties zijn zeer zeldzaam maar zoals alle medicatie kan ook Injectafer® eventueel bijwerkingen veroorzaken. Het wel of niet optreden van bijwerkingen zegt niets over de werking van het geneesmiddel.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn gewoonlijk mild van aard en verdwijnen vermoedelijk na korte tijd.

- Hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid, buikpijn, verstopping (constipatie), diarree, reactie op de injectieplaats, gevoelloosheid of een tintelend gevoel van de huid.

Allergische klachten die kunnen optreden gaan van huiduitslag en jeuk (netelroos), tot kortademigheid en bloeddrukverlaging bij een ernstige allergische reactie. De verpleegkundige controleert daarom steeds uw bloeddruk, hartslag en temperatuur om eventueel reacties op Injectafer® vast te stellen.

Wanneer er een overgevoelighedsreactie optreedt tijdens het toedienen, dient de behandeling onmiddellijk te worden stopgezet. Indien u zich tijdens de behandeling onwel zou voelen, verwittig dan zo snel mogelijk de verpleegkundige. Mocht u zich na de behandeling thuis onwel voelen neem dan contact op met uw (huis)arts.

De toediening van Injectafer® dient voorzichtig te gebeuren om lekkage van het product (toediening naast de ader) te voorkomen. Lekkage kan leiden tot irritatie van de huid en mogelijk een langdurige bruine verkleuring van de huid op de plaats van de injectie. Indien u pijn of een zwelling ervaart op de injectieplaats, verwittig dan zo snel mogelijk de verpleegkundige. Wanneer dit optreedt, moet de toediening onmiddellijk gestopt worden.

04 CONTACTGE- GEVENS

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, stel ze dan gerust aan uw (huis)arts of aan de verpleegkundige.

Telefoonnummers waar u terecht kan bij vragen of problemen:

ZOL Genk

- Dagziekenhuis Geneeskunde
tel. 089 80 83 40
- Dagkliniek Endocrinologie en
geriatrie, tel. 089 32 57 82
- Raadpleging Oncologie, tel.
089 80 83 30
- Raadpleging Gastro-Enterolo-
gie, tel. 089 32 65 12
- Algemeen nummer ziekenhuis
tel. 089 32 50 50

ZOL Maas en Kempen

- Dagziekenhuis Inwendige
geneeskunde, tel. 089 80 83
70
- Raadpleging Inwendige
geneeskunde, tel. 089 80 73
60
- Geriatisch dagziekenhuis tel.
089 80 85 65
- Algemeen nummer ziekenhuis
tel. 089 50 50 50

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be