

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Bisfosfonaten

Toediening via infuus

ZOL Maas en Kempen

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Beste,

Deze brochure geeft u meer informatie over het toedienen van bisfosfonaten via infuus en probeert op een aantal veelgestelde vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en/of de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op al uw vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1. Wat zijn bisfosfonaten
2. Voorbereiding
3. Dag van de behandeling
4. Over de behandeling
5. Bijwerkingen en complicaties
6. Contactgegevens

De geneesmiddelen Zometa, Pamidronaat en Xgeva zijn zogenaamde bisfosfonaten.

1. Wat zijn bisfosfonaten

Bisfosfonaten worden gebruikt om overmatige botafbraak tegen te gaan. Daarnaast wordt het gebruikt om een hoge calciumwaarde (hypercalciëmie) te behandelen.

In zeldzame gevallen kan de verhoogde botafbraak leiden tot een hoge calciumwaarde in het bloed. De verschijnselen hiervan zijn: vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, obstipatie, dorst en in sommige gevallen verwardheid.

De toediening van een bisfosfonaat kan deze verhoogde calciumwaarde weer verlagen naar een normale waarde waardoor de klachten verminderen. Verhoogde botafbraak, waarbij het evenwicht tussen botafbraak en botopbouw veranderd is, kan voorkomen bij patiënten met een kwaadaardige aandoening en bij uitzaaiingen in het bot. Ook postmenopauzale borstkan-

kerpatiënten die een hormoonbehandeling ondergaan, hebben een verhoogde kans op botontkalking. Zometa en Pamidronaat zijn medicijnen die de botafbraak afremmen waardoor de kans op botpijn, botinzakking of het breken van het bot sterk kan afnemen.

2. Voorbereiding

Drinken

Op de dag van de toediening is het belangrijk dat u veel drinkt.

Mondhygiëne

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u zorgt voor regelmatige gebitscontroles. Ook is het van belang dat uw gebitsprothese, als u die heeft, goed past.

Als u voor gebitscontrole naar uw tandarts gaat en u een vervolgbehandeling moet krijgen (het trekken van tanden of wortelkanaalbehandeling,...) vertel dan uw behandelend tandarts altijd dat u bisfosfonaten krijgt toegediend.

Neem altijd contact op met de behandelend arts als u mond- of gebitsproblemen ervaart. Denk hierbij aan losse kiezen, pijn of

zwellend, het niet genezen van zweren of afscheiding. Dit kunnen namelijk tekens zijn van osteonecrose van de kaak.

3. Dag van de behandeling

Op de dag van uw behandeling meldt u zich aan het onthaal om zich in te schrijven. Daarna wordt u verwezen naar het internistisch dagziekenhuis. Dit is route F27. U krijgt bij ons een plaats toegewezen in een zetel.

4. Over de behandeling

Toediening Zometa

Het medicijn wordt toegediend door middel van een infuus. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoe lang deze behandeling zal duren. In de regel is dit één keer per maand of met langere tussenpauzes. De eerste kuur duurt een uur. De volgende behandelingen duren ongeveer 15 minuten.

Toediening Pamidronaat

Het medicijn wordt toegediend door middel van een infuus. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoe lang deze behandeling zal

duren. Dit geneesmiddel kan niet bij u thuis worden toegediend. Duur van de behandeling is afhankelijk van de dosering van Pamidronaat.

Toediening Xgeva

Het medicijn wordt toegediend door middel van een subcutane inspuiting. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoe lang deze behandeling zal duren. De toediening kan soms samenvallen met een andere behandeling (chemo). Soms kan Xgeva ook toegediend worden in de thuissituatie door een thuisverpleegkundige.

5. Bijwerkingen en complicaties

Behandeling met Zometa of

Pamidronaat wordt over het algemeen goed verdragen. Soms kan na toediening van Zometa of Pamidronaat tijdelijk sprake zijn van spierpijn, koorts, hoofdpijn, maag- en darmklachten of het gevoel van algehele malaise. Deze klachten kunnen ontstaan binnen 24 uur en verdwijnen meestal binnen 48 uur. U kan zo nodig paracetamol (bv.

Dafalgan) hiervoor gebruiken na overleg met uw behandelend arts.

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak) is een heel zeldzame bijwerking die kan voorkomen bij patiënten die bisfosfonaten krijgen.

6. Contactgegevens

Als u vragen heeft kan u contact opnemen met:

- Internistisch dagziekenhuis IDZ, tel. 089 50 64 31
- Raadpleging Inwendige Geneeskunde, tel. 089 50 56 00

Bij vragen/problemen kan u contact opnemen met het IDZ, uw behandelend arts of uw huisarts. Bij acute problemen dient u zich te begeven naar de dienst Spoedgevallen.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be