


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Respiratoir virus

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemersstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Deze brochure geeft u meer informatie over de isolatie-indicatie respiratoir virus isolatie.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen. Uw behandelend arts en de verpleegkundigen zijn steeds bereid om op uw vragen te antwoorden.

Inhoudsverantwoordelijke: Dr. D. Steensels (arts infectiepreventie) | September 2023

INHOUDSTAFEL

1. Respiratoir virus	3
2. Maatregelen	3
2.1 Zorgverleners	
2.2 Toestel voor luchtzuivering	
2.3 Bezoekers	
2.4 Hoe kan u helpen?	
2.5 Wanneer kunnen deze maatregelen stoppen?	
3. Tot slot	6

01 RESPIRATOIR VIRUS

Er werd recent bij u een respiratoir virus vastgesteld. Respiratoire virussen kunnen infecties veroorzaken aan de luchtwegen. Voorbeelden hiervan zijn:

- SARS-CoV-2 (COVID-19)
- influenza A en B (griep)
- RSV (respiratoir syncytieel virus)
- hMPV (humaan metapneumovirus)
- parainfluenza virus 1-4
- adenovirus
- rhinovirus

Deze virussen worden overgedragen via druppels en via lucht (o.a. bij niezen, hoesten, praten, ...). Om overdracht naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers te voorkomen, zijn er specifieke voorzorgsmaatregelen nodig.

02 MAATREGELEN

2.1 Zorgverleners

Indien mogelijk wordt u opgenomen in een éénpersoonskamer. U kan ook samen met een andere patiënt met hetzelfde virus op een tweepersoonskamer gelegd worden (= cohortering). Verlaat de kamer niet op eigen initiatief.

De verpleegkundige hangt een isolatiefiche aan de deur zodat alle zorgverleners en bezoekers weten welke maatregelen er genomen moeten worden alvorens de kamer te betreden.

Alle zorgverleners ontsmetten de handen bij het betreden en verlaten van de kamer en bij elke indicatie in de kamer. Tevens dragen ze een chirurgisch masker en oogbescherming.

Indien mogelijk blijft zoveel mogelijk herbruikbaar verzorgingsmateriaal zoals een bloeddrukmeter en een thermometer bij u op de kamer.

Er worden voorzorgsmaatregelen genomen voor het gebruikte linnen.

Wanneer u in het kader van een behandeling of onderzoek de kamer moet verlaten, zal men u vragen de handen te ontsmetten en een chirurgisch masker te dragen. Het masker moet de neus en mond volledig bedekken en goed aansluiten op het gezicht.

2.2 Toestel voor luchtzuivering

Bij het hoofdeinde van uw bed wordt een luchtzuiveringstoestel geplaatst. Dit toestel zorgt ervoor dat de vervuilde lucht in de kamer wordt aangetrokken en door 3 filterlagen wordt gevoerd. Ziektekiemen die via de lucht worden overgedragen (vb. virussen, schimmels, bacteriën...), maar ook fijne deeltjes, stof, mijten en onaangename geurtjes worden vastgehouden door de filters. Daarna wordt de gezuiverde lucht weer terug in de kamer geblazen via de bovenkant van het toestel.

Het onderhoud van het toestel en de filters gebeurt door de dienst technisch onderhoud. Om een optimale luchtzuivering te garanderen is het belangrijk dat het toestel continu aan staat, ook

's nachts. Het toestel past zijn snelheid automatisch aan. Gebruik het toestel niet als nachttafel en plaats het niet tegen de muur of bed.



2.3 Bezoekers

Uw bezoek ontsmet grondig de handen bij het betreden en verlaten van de kamer. Tevens draagt elke bezoeker een chirurgisch masker dat beschikbaar is buiten de patiëntenkamer of in het sas. Wanneer uw bezoeker ziek is of een verminderde weerstand heeft, wordt het bezoek best uitgesteld. Wij vragen uw bezoekers om na het bezoek geen andere patiënten meer te bezoeken in het ziekenhuis.

2.4 Hoe kan u helpen?

Pas een goede hoesthygiëne toe:

- Gebruik een papieren wegwerp zakdoek. Hebt u geen papieren

zakdoek bij de hand? Hoest dan in de elleboogplooi.

- Bedek neus en mond maximaal bij een hoest- of niesbui.
- Gebruik een zakdoek maar één keer.
- Gooi de zakdoek na gebruik weg.
- Ontsmet of was regelmatig uw handen (vb. na hoesten en niezen, na toiletgebruik, voor het eten, ...).

Verlaat de kamer niet op eigen initiatief.

Belemmer de werking van het luchtzuiveringstoestel niet.

2.5 Wanneer kunnen deze maatregelen stoppen?

Na de start van de klachten (of na de vaststelling van een respiratoir virus, indien geen klachten), blijft u minimaal 7 dagen in isolatie. Op dag 7 wordt een nieuwe controle uitgevoerd. Op basis van die controle wordt door het laboratorium vastgesteld of de isolatiemaatregelen al dan niet gestopt kunnen worden.

03 TOT SLOT

Het volledige zorgteam probeert u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

Contact: Dienst Infectiepreventie
T 089 32 15 32
infectiepreventie@zol.be

Wij zijn er om u te helpen!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be