


ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Medisch Centrum André Dumont
ZOL MAAS EN KEMPEN



Brentuximab

(Adcetris®)

ZOL GENK

Campus Sint-Jan
Synaps Park 1
B 3600 Genk

Campus Sint-Barbara

Bessemmerstraat 478
B 3620 Lanaken

Medisch Centrum André Dumont

Stalenstraat 2a
B 3600 Genk

ZOL MAAS EN KEMPEN

Diestersteenweg 425
B 3680 Maaseik

ZOL GENK
tel. +32(0)89 80 80 80
ZOL MAAS EN KEMPEN
tel.+32(0)89 50 50 50
info@zol.be

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

In samenspraak met uw arts werd besloten om een behandeling met Adcetris® op te starten.

In deze brochure staan in het kort de mogelijke bijwerkingen opgesomd en enkele adviezen die u kunnen helpen om beter om te gaan met deze bijwerkingen.

Indien u bijwerkingen van de behandeling ondervindt, meldt u dit best aan uw behandelende arts bij een volgende consultatie of aan de verpleegkundige.

INHOUDSTAFEL

1. Inleiding

- 1.1 Hoe verloopt de behandeling?
- 1.2 Aandachtspunten
- 1.3 Mogelijke nevenwerkingen
- 1.4 Nevenwerkingen voorkomen
- 1.5 Raadpleeg uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige
- 1.6 Omkadering

01 INLEIDING

De werkzame stof van Adcetris® is Brentuximab-vedotin. Dit geneesmiddel is een antilichaam-geneesmiddelconjugaat. Dit wil zeggen dat Adcetris® zich gaat vasthechten aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen: het bindt namelijk aan CD30 op CD30-positieve tumorcellen. Zo kan het een cytotoxische stof (chemo) afleveren binnen in de kankercel. Hierdoor zal de groei van de tumorcellen gehinderd worden.

Adcetris® wordt soms gebruikt in combinatie met andere chemotherapie. Het geneesmiddel wordt dan voor of na de chemo toegediend.

1.1 Hoe verloopt de behandeling?

Een cyclus (of kuur) duurt 2 of 3 weken (afhankelijk van uw ziekte en behandelingschema). Een volgende cyclus start in principe 2 of 3 weken na de vorige toediening, als de bloeduitslagen en uw algemene toestand dit toelaten. U wordt op de eerste dag van de cyclus verwacht op dagziekenhuis geneeskunde voor de toediening van Adcetris®.

In het geval dat u een poortkatheter (of picc-katheter) heeft, wordt deze hiervoor gebruikt. Anders zal de verpleegkundige een katheter plaatsen in uw arm.

Vóór elke toediening van Adcetris® zal u geneesmiddelen krijgen ter preventie van koorts en/of een allergische reactie (paracetamol, cetirizine en/of corticosteroiden).

1.2 Aandachtspunten

Als u wordt behandeld met Adcetris® kan er zich ondanks de preventieve maatregelen toch een infusiereactie plaatsvinden. Indien u één of meerdere van onderstaande reacties ervaart, moet u de verpleegkundige verwittigen.

- Koorts en/of rillingen
- Huiduitslag
- Opvliegers
- Ademhalingsmoeilijkheden
- Hoofdpijn
- Hartkloppingen
- Spierstijfheid
- Vermoeidheid
- Keelirritatie
- Misselijkheid en braken

Indien u een reactie ervaart, moet u de verpleegkundige verwittigen!

Indien er bij u een reactie ontstaat, zal het infuus vertraagd of onderbroken worden. Bijgevolg geeft de arts het nodige advies voor het verderzetten van de behandeling. Het risico op mogelijke reacties verkleint meestal bij volgende toedieningen.

1.3 Andere nevenwerkingen

- Activiteit en rust in evenwicht bewaren
- Perifere neuropathie (tintelingen of een voos gevoel in vingers, tenen en/of voetzool)
- Haarverdunning
- Verhoogde vatbaarheid voor infecties
- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid en verminderde conditie
- Diarree of obstipatie
- Hoofd-, -spier en -gewrichtspijn

1.4 Nevenwerkingen voorkomen

- Infecties voorkomen
- Voorgeschreven medicatie innemen
- Voldoende drinken
- Rust en activiteit in evenwicht bewaren
- Goede mondhygiëne
- Wondjes voorkomen
- Huidverzorging

1.5 Raadpleeg uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige

- Wanneer u veranderingen waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond (tong, wangslimvliezen).
- Indien u pijn hebt in uw mond of keel.
- Wanneer u nog moeilijk kunt eten en op korte tijd veel gewicht verliest.
- Wanneer u koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft, wordt verwacht dat u de dag zelf nog contact neemt met uw huisarts (of dienst spoedgevallen).
- Als u meer dan twee dagen diarree heeft of moet braken.
- Wanneer u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- Indien er spontaan blauwe plekken ontstaan op uw lichaam, u regelmatig moeilijk een bloedneus kan stelpen of uw menstruatie verlengd is. Ook als u bloed moet braken of bloed in de urine ziet.
- Wanneer u aanhoudende krampende pijn of druk in de borstkas heeft
- Als u zich duizelig voelt, kortademig bent of u zich moe voelt bij de minste inspanning.



Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen die niet zijn voorgeschreven of aanbevolen door uw arts. Indien u koorts ($>38^{\circ}\text{C}$) heeft, raden wij aan om onmiddellijk de huisarts te verwittigen of u te begeven naar de spoedgevallen

1.6 Omkadering

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- De verpleegkundig consulent hematologie: 089 80 63 66
- Verpleegafdeling oncologie en hematologie (K45): 089 80 63 30
- Secretariaat oncologie en hematologie: 089 80 83 30
- Dagziekenhuis oncologie (GDK1): 089 80 83 43
- Buiten de werkuren via de telefooncentrale van het Ziekenhuis Oost-Limburg (089 80 80 80) of dienst spoedgevallen.

Succes met de behandeling!



[illegible]



www.ZOL.be



www.twitter.com/ZOLziekenhuis



www.facebook.com/ZOLzh



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be