

Beste patiënt,
In samenspraak met uw arts werd beslist om
chemotherapie op te starten in de vorm van
tabletten in combinatie met een infuus voor de
behandeling van een hersentumor.

PCV PROCARBAZINE (NATULAN), CCNU (LOMUSTINE) EN VINCRIPTINE (8 WEKEN)

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

Eén cyclus duurt 8 weken (57 dagen)

Dag 1:

- Controleraadpleging bij de oncoloog voorafgaand met een bloedname (1u vóór afspraak)
- Lomustine en de medicatie tegen misselijkheid worden voorgeschreven en mogen hier in de Ziekenhuisapotheek afgehaald worden
- Deze medicatie dient nuchter (3u) genomen te worden, 's avonds vóór het slapen gaan. Eerst een middel tegen misselijkheid en 30 min later mag de Lomustine ingenomen worden

Dag 8:

- Opname op dagziekenhuis Oncologie (GDK1) waar ook de bloedname gebeurt
- Raadpleging bij de oncoloog, afhankelijk van de bloedwaarden wordt de medicatie voorgeschreven
- De medicatie tegen misselijkheid wordt via een infuus gegeven en 30 min later wordt Vincristine toegediend (in totaal duurt deze behandeling +/-45 min)

- De oncodiëtiste komt langs voor uitleg van het Tyramine-arm dieet dat u 2 weken dient te volgen
- De medicatie (Procarbazine) die u gedurende 14 dagen dient te nemen mag afgehaald worden in de Ziekenhuisapotheek

Dag 8-21:

- Op deze dagen mag u dagelijks Natulan (=Procarbazine) innemen bij het avondeten, voorafgegaan door een middel tegen misselijkheid (30 min vooraf)
- Tijdens deze periode dient u een Tyramine-arm dieet volgen

Dag 29:

- Opname op dagziekenhuis Oncologie (GDK1) waar ook weer de bloedname gebeurt
- Raadpleging bij de oncoloog, afhankelijk van de bloedwaarden wordt de medicatie voorgeschreven
- De medicatie tegen misselijkheid wordt via een infuus gegeven en 30 min later wordt Vincristine toegediend (in totaal duurt deze behandeling +/-45 min)

Dag 30-56:

- Rust

Dag 57:

- Start tweede cyclus

TYRAMINEBEPERKT DIEET

Tyramine is een eiwitachtige stof in het lichaam. Tijdens uw behandeling wordt deze stof niet afgebroken en kan de hoeveelheid ervan in uw bloed stijgen. Dit veroorzaakt dan hoge bloeddruk, verhoogde pols, hartkloppingen, ook migraine en duizeligheid kunnen voorkomen. Tyramine komt van nature voor in veel voedingsmiddelen. Uw voeding kan de hoeveelheid in uw bloed dus nog sterker verhogen. Daarom is het tijdens de inname van Natulan (=Procarbazine) belangrijk een dieet te volgen, dat arm is aan tyramine.

- **Zo constipatie:** Movicol
1-4 zakjes/dag, op geleide van ernst constipatie
- **Zo misselijk:** Metaclopramide / Motilium zo nodig

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Vermoeidheid, verminderde conditie
- Misselijkheid, smaakverandering
- Obstipatie: dieet aanpassen of laxeermiddel nemen
- Mucositis (mondvliesontsteking)
- Neuropathieën (tintelingen, voos gevoel in vingertoppen of tenen)
- Verminderde bloedaanmaak met verhoogde kans op infectie en bloedingen
- verminderd aantal witte bloedcellen: hierdoor vergroot de kans op een infectie
- verminderd aantal rode bloedcellen: hierdoor is er een verhoogd risico op bloedarmoede waardoor u sneller moe en futloos bent
- verminderd aantal bloedplaatjes: dit vergroot de kans op blauwe plekken en/of onderhuidse bloedingen, neusbloedingen

Bij koorts >38° of erg ziektegevoel: huisarts of dokter van wacht raadplegen of naar dienst Spoedgevallen komen

Bij ontstaan van blauwe plekken, rode vlekjes, neusbloedingen of tandvleesbloedingen: naar dienst Spoedgevallen komen

- **Zo constipatie:** Movicol
1-4 zakjes/dag, op geleide van ernst constipatie
- **Zo misselijk:** Metaclopramide / Motilium zo nodig

AANDACHTSPUNTEN

Bij wondproblemen (roodheid, zwelling of pijn thv de wonde) een afspraak maken op de wondraadpleging Neurochirurgie 089/326043

- Chemotabletten niet kauwen, in geheel doorslikken
- Handen wassen na inname medicatie
- Neem geen nieuwe dosis in indien u gebruikt heeft of deze vergeten bent
- Meld een vergeten dosis bij uw volgende raadpleging
- Raadpleeg uw arts als u teveel Natulan genomen hebt

Een nieuwe evaluatie bij de neurochirurg met MRI wordt telkens na 2 cycli PCV gepland

Als deze geruststellend is wordt de behandeling verder gezet

In totaal kan u 6 cycli adjuvante chemotherapie volgens het PCV-schema krijgen

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, sociaal verpleegkundige, oncocoach, diëtiste, psychologe werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- secretariaat Neurochirurgie: 089/32 60 43
- secretariaat Oncologie: 089/32 65 52
- sociaal verpleegkundige: An Bottelier 089/32 16 52
- oncocoach Neuro: Christel Vangompel 089/32 65 82
- neuropsychologe: Anouk Peeters 089/32 56 92
- buiten de werkuren via de telefooncentrale van het ziekenhuis: 089/32 50 50 of de dienst Spoedgevallen

SUCCES MET DE BEHANDELING!

PVC kuur: 1 kuur = 8 weken

- **Dag 1 ():**
inname Lomustine (.... tabletten, eenmalige inname)
- **Dag 8 () dag 21 ():**
inname Procarbazine (.... tabletten, eenmalige inname)

PVC kuur: 1 kuur = 8 weken

- **Dag 8 ():** bloedname + raadpleging dr.
+ infuus Vincristine op dagcentrum
- **Dag 29 ():** bloedname + raadpleging dr.
+ infuus Vincristine op dagcentrum

