

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om een combinatietherapie te starten onder de vorm van chemotherapie (Carboplatine – Paclitaxel) voor de behandeling van een pelviene kanker.

CARBOPLATINE - PACLITAXEL (WEKELIJKS)

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via verschillende infusen. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 3 dagopnames voor chemotherapie: dag 1, dag 8 en dag 15. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De dag voor een chemokuur gebeurt steeds een bloedcontrole om te beoordelen of de bloedwaarden goed zijn voor de volgende therapie. Zoniet wordt u gecontacteerd om de kuur uit te stellen. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus of een tussentijdse CT-scan via de raadpleging.

AANDACHTSPUNTEN

Het toedienen van corticosteroïden (namelijk dexamethasone) kan bijwerkingen veroorzaken zoals maaglast, slaapmoeilijkheden, verhoogde eetlust. De medicatie is belangrijk voor uw behandeling, het zorgt voor een vermindering van de bijwerkingen en allergische reacties. Bespreek deze klachten met uw zorgverleners.

Bij misselijkheid mag u tot 6 tabletten Litican/ Limican innemen per dag.

Er wordt één tablet bisacodyl 5 mg (Dulcolax) meegegeven. Neem deze medicatie op dag 2 's avonds wanneer u nog geen ontlasting heeft gehad sinds de chemotherapie.

Bij constipatie mag u Movicol zakjes nemen tot 4 per dag telkens met voldoende water. Uw arts schrijft deze therapie voor zodat u een voorraad van deze medicatie kan afhalen bij de apotheek.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verminderd aantal witte -en rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Mondslimvliesontsteking
- Smaak- en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Constipatie
- Huidveranderingen
- Haarverlies (ijskap kan besproken worden)
- Ooglast
- Oorsuizingen en verminderd gehoor
- Grieperig gevoel
- Tintelingen of voos gevoel in vinger-toppen en/of tenen (ijshandschoenen en -pantoffels ter preventie)

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgeschreven medicatie innemen

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie brochure nevenwerkingen bij chemotherapie voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of met de verpleegkundig consulent of dat u zich begeeft naar de spoeddienst.

- Aanhoudend krampende pijn of druk in uw borstkas
- Na inname van 1 Paracetamol van 1g **blijvend koorts** (vanaf 38°C) en/of rillingen
- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium
- Diarree, maar ook braken
- Duizeligheid en kortademigheid of pijn op de borst of moe bij de minste inspanning
- Spontaan blauwe plekken, regelmatig een bloedneus of verlengde menstruatie. Bloed braken of bloed in de urine
- Veranderingen in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond
- Niet meer voldoende kunnen eten en drinken
- Ernstig vermagering
- Uitgesproken moe en dagdagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen als u vermoedt dat u een infectie hebt. Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kan u steeds contact opnemen met **de verpleegkundig consulenten 089/ 80 63 71**, dagzaal oncologie 089/ 80 83 40 of de raadpleging oncologie 089/ 80 83 30.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van het ZOL 089/80 80 80 of de dienst spoedgevallen.

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Therapie wekelijks				Duur
	Dag 1 = dagklieniek	Dag 2 = thuis	Dag 8 = dagklieniek	Dag 15 = dagklieniek	
Akynzeo (tegen misselijkheid)	1 capsule				
cortisone	1 ampul intraveneus		1 ampul 1 ml	1 ampul 1 ml	
Paclitaxel	1 infuus		1 infuus	1 infuus	60 min
Spoeling (NaCl)	1 infuus		1 infuus	1 infuus	
Carboplatine	1 infuus				60 min
Dulcolax (bisacodyl)		1 tablet 's avonds indien geen stoelgang sinds de chemotherapie			