

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om een behandeling te starten met enfortumab vedotin (Padcev®).

ENFORTUMAB VEDOTIN (PADCEV®) BIJ UROLOGISCHE KANKER

WAT IS PADCEV®

Padcev bevat de werkzame stof enfortumab vedotin, die bestaat uit een monoklonaal antilichaam gekoppeld aan een stof die bedoeld is om kankercellen te doden. Het monoklonale antilichaam herkent bepaalde kankercellen en levert de stof af aan de kankercellen.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via een infuus. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 3 toedieningen via de dagzaal. De laatste week is uw rustweek. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus.

AANDACHTSPUNTEN

Tijdens uw behandeling met Padcev® is er onder andere een risico op een ernstige huidreactie (Steven-Johnson-syndroom). Neem contact op met uw arts of verpleegkundig consulent wanneer u klachten ervaart van:

- Huiduitslag of jeuk die erger wordt of na de behandeling steeds terugkeert.
- Blaarvorming of vervelling
- Pijnlijke wondjes of zweren in de mond, neus, keel of de schaamstreek
- Koorts
- Griepachtige klachten

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Neuropathie (tintelingen of voos gevoel in de handen en voeten)
- Huidreactie
- Vermoeidheid
- Veranderde smaak
- Haarverlies
- Misselijkheid, diarree en braken
- Verminderde eetlust
- Droge ogen
- Gewichtsverlies
- Bloedarmoede
- Pneumonitis (longontsteking door Padcev)
- Verhoogd suikergehalte in het bloed

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw arts of met de verpleegkundig consultant:

- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium.
- Diarree, maar ook braken.
- Als u zich duizelig voelt, kortademig bent of pijn op de borst ervaart of u zich moe voelt bij de minste inspanning.
- Als u veranderingen waarneemt in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond.
- Niet meer voldoende kunnen eten en drinken
- Ernstige vermagering.
- Als u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- Als u klachten ervaart die kunnen wijzen op een huidreactie (Steven-Johnson-syndroom)

Bij koorts (vanaf 38°C) en/of bij rillingen raden wij u aan om naar de spoedgevallen te komen.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consultant, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werkt nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- secretariaat oncologie: 089 80 83 30
- verpleegkundig consultant urologie: 089 80 63 68
- dagziekenhuis oncologie: 089 80 83 40
- buiten de werkuren via de telefooncentrale van het ziekenhuis: 089 80 80 80 of de dienst spoedgevallen

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Dag				Duur
	1	8	15	15-28	
Padcev®	1 infuus	1 infuus	1 infuus	Rustweek	30 min