

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om een doelgerichte therapie te starten (pertuzumab oftewel Perjeta) voor de behandeling van een HER-2 positieve borstkanker.

PERTUZUMAB (PERJETA®)

HOE WERKT DE BEHANDELING?

De werkzame stof van Perjeta is pertuzumab. Het wordt gegeven in combinatie met Herceptine® (trastuzumab) en vaak al opgestart tijdens de chemotherapie. Pertuzumab is een monoklonaal antilichaam. Het is een geneesmiddel dat zich vasthecht op bepaalde receptoren (HER-2 eiwitten) op de wand van de tumorcellen. Door de vasthechting van pertuzumab gaat de groei van kankercellen geremd worden en gaan ze uiteindelijk afsterven.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening gebeurt op de dagkliniek geneeskunde (GDK1) en gebeurt via een infuus. De behandeling krijgt u om de 3 weken. Een bloedafname is niet nodig, tenzij er ook chemotherapie gegeven wordt.

AANDACHTSPUNTEN

Een infuusreactie doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door:

- huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam)
- een gevoel van benauwdheid
- lage bloeddruk
- koorts en/of rillingen
- misselijkheid
- overmatig transpireren

Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige van dagkliniek of aan de arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Vermoeidheid
- Diarree is mogelijk
- Huiduitslag
- Hartproblemen, namelijk een verminderde pompfunctie van het hart. (In combinatie met Herceptine) Daarom wordt er tijdens de behandeling regelmatig een echografie van het hart uitgevoerd.

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN

Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of borstverpleegkundige/verpleegkundig consulent.

- Aanhoudende kramp of pijn op de borstkas
- **Koorts vanaf 38°C**
- Niet meer voldoende kunnen eten en/of drinken
- Kortademigheid

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulenten, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met de borstverpleegkundigen/verpleegkundig consulenten gynaecologie **089/80 63 70** - borstverpleegkundige@zol.be, dagziekenhuis oncologie **089/ 80 83 40** of de raadpleging oncologie **089 80 83 30**.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van ZOL 089/ 80 80 80 of de spoeddienst.

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Therapie om de drie weken		Duur
	Dag 1 = dagkliniek	Dag 2-21	
Perjeta (pertuzumab)	1 infuus		Eerste maal infuus over 60 minuten Vanaf de 2e toediening infuus over 30 minuten