

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om een behandeling te starten met enfortumab vedotin (Padcev®) en Pembrolizumab (Keytruda®).

ENFORTUMAB VEDOTIN (PADCEV®) - PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA®) BIJ UROLOGISCHE KANKER

WAT IS PADCEV® - KEYTRUDA®

Padcev® bevat de werkzame stof enfortumab vedotin. Dit is een zogenoemd antistof-geneesmiddelconjugaat, waarbij een monokonaal antilichaam is gekoppeld aan een celdodende stof. Het antilichaam herkent specifieke kenmerken op bepaalde kankercellen en brengt de toxische stof gericht naar deze cellen, waardoor ze worden vernietigd.

Keytruda® is een immuuntherapie die het eigen afweersysteem activeert en versterkt. Het helpt het immuunsysteem om kankercellen te herkennen en aan te vallen.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via een infuus. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Één cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 2 toedieningen via de dagzaal. De laatste week is uw rustweek. Dag 1 is altijd

de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus.

AANDACHTSPUNTEN

Tijdens uw behandeling met Padcev® is er onder andere een risico op een ernstige huidreactie (Steven-Johnson-syndroom). Neem contact op met uw arts of verpleegkundig consulent wanneer u klachten ervaart van:

- huiduitslag of jeuk die erger wordt of na de behandeling steeds terugkeert
- blaarvorming of vervelling
- pijnlijke wondjes of zweren in de mond, neus, keel of de schaamstreek
- koorts
- griepachtige klachten

Er kan zich zelden een infuusreactie voordoen. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam). Een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen.

Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er snel en adequaat kan worden gereageerd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN VAN PADCEV®

- Neuropathie (tintelingen of voos gevoel in de handen en voeten)
- Huidreactie
- Vermoeidheid
- Veranderde smaak
- Haarverlies
- Misselijkheid, diarree en braken
- Verminderde eetlust
- Droge ogen
- Gewichtsverlies
- Bloedarmoede
- Ontstekingsreactie van de longblaasjes (met klachten als hoesten, koorts en/of kortademigheid)
- Verhoogd suikergehalte in het bloed

Immuuntherapie kan ook nevenwerkingen geven. Hiervoor verwijzen we naar de algemene informatie fiche van immuuntherapie.

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw arts of met de verpleegkundig consulent:

- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium.
- Diarree, maar ook braken.
- Als u zich duizelig voelt, kortademig bent of pijn op de borst ervaart of u zich moe voelt bij de minste inspanning.
- Als u veranderingen waarneemt in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond.

- Niet meer voldoende kunnen eten en drinken
- Ernstige vermagering.
- Als u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.
- Als u klachten ervaart die kunnen wijzen op een huidreactie (Steven-Johnson-syndroom of als u klachten ervaart die vermeld staan in de algemene informatie fiche over immunotherapie (zoals koorts, huiduitslag of ademhalingsproblemen).

Bij koorts (vanaf 38°C) en/of bij rillingen raden wij u aan om naar de spoedgevallen te komen.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig

consulenten, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werkt nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- secretariaat oncologie: 089 80 83 30
- verpleegkundig consulenten urologie: 089 80 63 68
- dagziekenhuis oncologie: 089 80 83 40
- buiten de werkuren via de telefooncentrale van het ziekenhuis: 089 80 80 80 of de dienst spoedgevallen

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Dag			Duur
	1	8	8-21	
Padcev®	1 infuus	1 infuus	-	30 min
Keytruda®	1 infuus	-	-	30 min