

Beste patiënt,

Uw arts heeft besloten een transperineale prostaatbiopsie uit te voeren. Deze fiche biedt u de nodige informatie over de procedure.

TRANSPERINEALE PROSTAATBIOPSIE

WAT IS DE PROSTAAT?

De prostaat is een kleine klier, ongeveer zo groot als een walnoot, die vlak onder de blaas ligt en de plasbuis omringt. De prostaat maakt een vloeistof die samen met zaadcellen sperma vormt. Bij het ouder worden kan de prostaat groter worden. Meestal is dit goedaardig, maar soms kunnen er ook kwaadaardige cellen ontstaan.

WAAROM DIT ONDERZOEK?

De uroloog wil bij u graag prostaatkanker uitsluiten. Mogelijke redenen hiervoor zijn:

- Verhoogde PSA-waarde in het bloed (PSA is een eiwit dat door de prostaatcellen wordt aangemaakt)
- Verdacht klinisch onderzoek
- Afwijkingen op de MRI-scan of echografie.

Met een prostaatbiopsie kan de arts stukjes weefsel (naaldbiopsie) afnemen en laten onderzoeken onder de microscoop om te zien of er kwaadaardige cellen aanwezig zijn.

Bij een transperineale prostaatbiopsie gebeurt dit via het perineum. Dit is de huid tussen de balzak en de anus.

VOORBEREIDING

- Bloedverdunners: bespreek dit tijdig met uw arts. Soms moet u enkele dagen voor het onderzoek stoppen. Dit is niet het geval voor aspirine (Asaflow, Cardio-Asperine), maar wel voor de meeste andere bloedverdunners.
- Scheer indien nodig uw perineum
- Kom niet met de fiets naar het ziekenhuis

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

- U ligt op de rug met de benen in de steunen.
- Het perineum wordt ontsmet.
- De arts verdooft de huid en de diepere weefsels rond de prostaat. Dit kan even branderig aanvoelen.
- Met een dunne naald neemt de arts enkele biopsieën. U hoort hierbij een klik geluid.
- De procedure duurt 10 tot 30 minuten.

NA HET ONDERZOEK

- Na het onderzoek mag u naar huis. U kan zich best laten rijden, maar zelf rijden mag wel als u een half uurtje wacht na de procedure.
- Vermijd gedurende 48 uur fietsen of zware inspanningen
- Neem paracetamol 1g bij pijn
- Drink voldoende
- Gedurende de eerste dagen is bloed via het wondje of in de urine normaal. Zeldzaam ook in de stoelgang. Bloed in het sperma is eerder de regel dan de uitzondering, verwacht enkele weken rood sperma en nadien bruinig. Regelmatige ejaculatie bevordert de evacuatie van deze bloedresten.

WANNEER CONTACT OPNEMEN

Bel onmiddellijk uw huisarts of de raadpleging urologie bij:

- Koorts vanaf 38°C.
- Koude rillingen.
- Niet meer kunnen plassen.
- Hevige pijn of bloeding.

BESPREKEN VAN DE RESULTATEN

De bipten worden onderzocht door de patholoog. Uw uroloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafpraak, meestal na 7 - 14 dagen. Dan hoort u ook of verder onderzoek of behandeling nodig is.

CONTACT

Bij eventuele vragen of problemen kan u steeds contact opnemen met de raadpleging Urologie op het nummer 089 80 83 80.