

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om een chemotherapie (Cisplatinum - Gemcitabine) en immuuntherapie (Durvalumab) te starten voor de behandeling van een niet-kleincellige longkanker.

CISPLATINUM - GEMCITABINE - DURVALUMAB (SPLIT DOSE) BIJ UROLOGISCHE KANKER

HOE WERKT UW BEHANDELING?

Uw behandeling is een combinatietherapie die bestaat uit chemotherapie en immuuntherapie.

Chemotherapie is de behandeling van kanker door celdodende medicatie. Deze medicatie treft alle delende cellen, ook de gezonde cellen. De kankercellen worden echter harder getroffen door de chemotherapie, omdat zij sneller delen dan de gezonde cellen.

Immuuntherapie activeert en versterkt het eigen immuunsysteem om de kankercellen te herkennen en vernietigen.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie. Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 2 dag opnames voor chemotherapie (Dag 1 + 8). Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen

en uw algemene toestand dit toelaten. In totaal worden 4 kuren toegediend.

Na vier cycli van de combinatietherapie ondergaat u de blaasoperatie. Daarna ontvangt u nog acht behandelingen met durvalumab, telkens eenmaal per vier weken.

AANDACHTSPUNTEN

U krijgt veel vocht toegediend. Dit is belangrijk om uw nieren te beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten van chemotherapie. De verpleegkundige zal tijdens de behandeling de hoeveelheid urine die u plast en uw lichaamsgewicht opvolgen. U wordt dus dagelijks gewogen. Indien nodig wordt er vochtafdrijvende medicatie voorgeschreven.

Bij misselijkheid mag u tot 6 tabletten Litican innemen per dag. Bij constipatie mag u Movicol zakjes nemen tot 4 per dag telkens met voldoende water.

Koorts op de dag van toediening van chemotherapie wijst meestal op een nevenwerking en niet op een infectie. Als u zich echter ziek voelt en/of de

koorts aanhoudt, raadpleegt u best toch een arts

Er kan zich zelden een infuusreactie voordoen. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

Productnaam	Dag					Duur
	1	2-7	8	9	10-21	
Gemcitabine	1 infuus		1 infuus			30 min
Cisplatinum	1 infuus		1 infuus			60 min
Durvalumab	1 infuus					30 min
Dexamethasone	1 infuus		1 infuus			
Kytril	1 infuus		1 infuus			
Na vier kuren chemo-immunotherapie volgt de blaas operatie Na de blaasoperatie ontvangt u nog acht keer Durvalumab, telkens éénmaal per vier weken						