

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om een chemotherapie (Cisplatine – Gemcitabine) en immuuntherapie (Durvalumab) te starten voor de behandeling van een urologische kanker.

CISPLATINE - GEMCITABINE - DURVALUMAB BIJ UROLOGISCHE KANKER

HOE WERKT UW BEHANDELING?

Uw behandeling is een combinatietherapie die bestaat uit chemotherapie en immuuntherapie.

Chemotherapie is de behandeling van kanker door celdodende medicatie. Deze medicatie treft alle delende cellen, ook de gezonde cellen. De kankercellen worden echter harder getroffen door de chemotherapie, omdat zij sneller delen dan de gezonde cellen.

Immuuntherapie activeert en versterkt het eigen immuunsysteem om de kankercellen te herkennen en vernietigen.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

Voor de start van uw behandeling zal uw arts voorstellen om een katheter te plaatsen. Dit kan een poortkatheter of PICC zijn. Meer informatie hierover vindt u in de desbetreffende brochures.

De toediening wordt georganiseerd op de afdeling GK45 en dagzaal oncologie en gebeurt via verschillende infusen. Dag 1 met overnachting en een dagopname op dag 8. Het schema op de

achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 3 weken (21 dagen) en omvat 2 opnames voor chemotherapie (Dag 1 + 8) voor chemotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus.

Na vier cycli van de combinatietherapie ondergaat u de blaasoperatie. Daarna ontvangt u nog acht behandelingen met durvalumab, telkens eenmaal per vier weken.

AANDACHTSPUNTEN

U krijgt veel vocht toegediend. Dit is belangrijk om uw nieren te beschermen tegen mogelijke schadelijke effecten van chemotherapie. De verpleegkundige zal tijdens de behandeling de hoeveelheid urine die u plast en uw lichaamsgewicht opvolgen. U wordt dus dagelijks gewogen. Indien nodig wordt er vochtafdrijvende medicatie voorgeschreven.

Bij misselijkheid mag u tot 6 tabletten Litan innemen per dag. Bij constipatie mag u Movicol zakjes nemen tot 4 per dag telkens met voldoende water.

Koorts op de dag van toediening van chemotherapie wijst meestal op een nevenwerking en niet op een infectie. Als u zich echter ziek voelt en/of de koorts aanhoudt, raadpleegt u best toch een arts.

Er kan zich zelden een infuusreactie voordoen. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over het hele lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Verminderd aantal witte -en rode bloedcellen
- Verminderd aantal bloedplaatjes
- Misselijkheid en braken
- Mondslijmvliesontsteking
- Smaak- en reukverandering
- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Buikloop (diarree)
- Constipatie
- Huidveranderingen
- Haarverduunning, zelden haarverlies
- Ooglast
- Oorsuizingen en verminderd gehoord
- Griepig gevoel

- Tintelingen of voos gevoel in vinger-
toppen en/of tenen

Immuuntherapie kan ook nevenwerkingen geven. Hiervoor verwijzen we naar de algemene infofiche van immuuntherapie.

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgescreven medicatie innemen

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie brochure nevenwerkingen bij chemotherapie en/of immuuntherapie voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw arts of met de verpleegkundig consulent:

- Na inname van 1 Paracetamol van 1g **blijvend koorts** (vanaf 38°C) en/of rillingen.
- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium
- Diarree heeft, maar ook moet braken.
- Duizeligheid, kortademigheid, felle vermoeidheid.
- Spontaan ontstaan van blauwe plekken, moeilijk te stoppen of frequente neusbloedingen, verlengde menstruatie, bloedbraken, bloed plassen.
- Als u veranderingen waarneemt in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond.
- Niet meer voldoende kunnen eten en drinken.
- Ernstige vermagering.
- Als u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen wanneer u vermoedt dat u een infectie hebt. Neem onmiddellijk contact op met uw (huis) arts of (thuis)verpleegkundige.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werkt nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met: verpleegkundig consulent Sabine, Christophe of Liesbet: 089 32 65 84 - sabine.vandecasteele@zol.be, christophe.eerlings@zol.be, liesbet.vastmans@zol.be, verblijfsafdeling GK45 089 80 63 30 of raadpleging oncologie 089 80 83 30

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Dag					Duur
	1	2-7	8	9	10-21	
Gemcitabine	1 infuus		1 infuus			30 min
Cisplatium	1 infuus					60 min
Spoeling	Infuus					Over de nacht
Durvalumab	1 infuus					30 min
Dexamethasone	1 infuus					
Kytril	1 infuus					
Na vier kuren chemo-immunotherapie volgt de blaas operatie						
Na de blaasoperatie ontvangt u nog acht keer Durvalumab, telkens éénmaal per vier weken						