

Beste patiënt,

In samenspraak met uw arts werd beslist om immuuntherapie te starten (Durvalumab).

TREMELIMUMAB-DURVALUMAB (DIO)

WAT IS IMMUUNTHERAPIE

Immuuntherapie activeert en versterkt het eigen immuunsysteem om de kankercellen te herkennen en vernietigen.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De behandeling bestaat uit twee soorten immuuntherapie. Tremelimumab en Durvalumab. De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie en gebeurt via een infuus.

Tijdens de eerste cyclus krijgt u zowel Durvalumab als Tremelimumab toegediend. Vanaf de tweede cyclus wordt enkel Durvalumab toegediend.

Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt 4 weken (28 dagen) en omvat 1 toediening via de dagzaal. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 4 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en uw algemene toestand dit toelaten. Na elke toediening krijgt u een afspraak mee voor de volgende cyclus of een tussentijdse CT-scan via de raadpleging.

AANDACHTSPUNTEN

Een *infuusreactie* doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl u nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat u dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

- Ongewone vermoeidheid
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Misselijkheid
- Buikloop (diarree)
- Huidveranderingen, huiduitslag

NEVENWERKINGEN VOORKOMEN

- Infecties voorkomen
- Wondjes voorkomen
- Voldoende drinken
- Mondhygiëne en mondspoeling
- Rust en beweging
- Huidverzorging
- Voorgeschreven medicatie innemen

WAT DOEN ALS ER NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie infofiche 'immunotherapie' voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of met de verpleegkundig consultant:

- Aanhoudend krampende pijn of druk in uw borstkas heeft.
- Na inname van 1 Paracetamol van 1g **blijvend koorts** (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- Langer dan 2 dagen diarree heeft, ondanks de inname van Imodium.
- Diarree heeft, maar ook moet braken.
- Zich duizelig voelt, kortademig bent of pijn op de borst ervaart of u zich moe voelt bij de minste inspanning.
- Er spontaan blauwe plekken ontstaan, regelmatig moeilijk een bloedneus kan stelpen of uw menstruatie verlengd is. Ook als u bloed moet braken of bloed in de urine ziet.
- Veranderingen waarneemt in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond.
- Niet meer voldoende kunt eten en drinken.
- U ernstig vermagert.
- Zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Bij koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen raden wij u aan om naar de spoedgevallen te komen.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, de verpleegkundig consultants, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste, de psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking.

Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met:

- secretariaat gastro-entero: 089/80 73 30
- verpleegkundig consultants digestieve 089/ 80 63 63 of 089/80 63 64
- dagziekenhuis oncologie 089/80 83 40
- buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van ziekenhuis: 089/80 80 80 of de dienst spoedgevallen.

SUCCES MET DE BEHANDELING!

Productnaam	Dag		Duur
	1	2- 28	
Tremelimumab	1 infuus		60 min enkel tijdens cyclus 1
Durvalumab	1 infuus		60 min