

Beste patiënt,

Via deze fiche willen we u informeren over het gebruik van Kadcyła® bij borstkanker. Mocht u tijdens de behandeling nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons deze te stellen.

TRASTUZUMAB-EMTASINE (KADCYLA®)

WAT IS KADCYLA® EN HOE WERKT HET?

Kadcyła® of T-DMI is een celremmend geneesmiddel dat zich richt op HER2-positieve kankercellen, waar het chemotherapie rechtstreeks in de kankercel aflevert en deze vernietigt. Het is een koppeling van 2 geneesmiddelen: één doelgerichte therapie (trastuzumab) en één chemotherapie (emtansine).

Kadcyła® wordt gegeven voor de behandeling van gemetastaseerde Her2-positieve borstkanker of HER2-positieve vroege borstkanker die nog restziekte hebben (in de borst en/of lymfeklieren) na een eerdere voorbehandeling met chemotherapie en HER2-gerichte therapie.

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

De toediening wordt georganiseerd op de dagzaal oncologie.

Kadcyła® wordt via een infuus toegediend:

- **Elke 3 weken** (1 keer om de 21 dagen) als de bloedsuitslagen en je algemene toestand het toelaten
- De 1ste toediening duurt 90 minuten, vanaf de tweede toediening 30 minuten indien goed verdragen

- Het schema op de achterzijde geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie

AANDACHTSPUNTEN BIJ

KADCYLA®

Kadcyła® kan een invloed hebben op je hartfunctie. Je zal daarom op regelmatige tijdstippen een hartfunctieonderzoek krijgen. Meld het aan je arts als je last krijgt van kortademigheid, pijn op de borstkas of opgezwollen voeten.

Kadcyła kan een invloed hebben op de leverfunctie. Dat voel je meestal niet, maar de arts kan het in je bloed vaststellen. Ook de bloedplaatjes kunnen soms licht dalen, maar ook dat voel je meestal niet. Afwijkingen in de bloedwaarden kunnen wel soms een reden zijn om de behandeling uit te stellen of de dosis aan te passen.

Gebruik betrouwbare anticonceptie tijdens en tot 7 maanden na de behandeling

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

Niet iedereen ervaart bijwerkingen, maar mogelijke klachten zijn:

- Misselijkheid of braken
- Smaak- en reukveranderingen
- Stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies bv. aften)
- Ongewone vermoeidheid, gebrek aan energie, lichamelijke zwakte
- Invloed op seksualiteit en intimiteit
- Gevoelens van angst, boosheid en verdriet
- Constipatie of diarree
- Griepig gevoel: hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen
- Buikpijn
- Kortademigheid, hoesten
- Koorts
- Bloedingen
- Tintelingen of voos gevoel in vingers en/of tenen
- Haaruitval (<6%) of dunner worden van de haren
- Verstoring van de bloedwaarden (lage witte bloedcellen, rode bloedcellen, bloedplaatjes)
- Allergische reactie of infuusreactie (tijdens of kort na infusie): huiduitslag, benauwd voelen, lage bloeddruk, rillingen, koorts, misselijk, transpireren.

- Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er adequaat kan worden gereageerd.

WAT DOEN ALS ER

NEVENWERKINGEN ZIJN?

Zie brochure nevenwerkingen bij chemotherapie voor de eerste hulp. Bij volgende nevenwerkingen adviseren we dat u contact neemt met uw huisarts of met de verpleegkundige consulent of dat u zich begeeft naar de spoeddienst.

- Aanhoudend krampende pijn of druk in uw borstkas
- Na inname van 1 Paracetamol van 1g **blijvend koorts** (vanaf 38°C) en/of rillingen
- Langer dan 2 dagen diarree, ondanks de inname van Imodium
- Diarree, maar ook braken
- Duizeligheid, kortademigheid of pijn op de borst of moe bij de minste inspanning

- Spontaan blauwe plekken, regelmatig een bloedneus of verlengde menstruatie. Bloed braken of bloed in de urine
- Veranderingen in het mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes in uw mond

Bij koorts (vanaf 38°C) en/of bij rillingen raden we u aan om naar de spoeddienst te komen, Neem eventueel contact op met de verpleegkundig consulent.

CONTACTGEGEVENS

Het multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig consulent, de sociaal verpleegkundige, de diëtiste en psycholoog werken nauw samen om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject door het ziekenhuis komt u met elk van hen in aanraking. Bij eventuele vragen of problemen kunt u steeds contact opnemen met de verpleegkundig consulenten borst 089/80 63 70, dagziekenhuis oncologie 089/80 83 40 of de raadpleging oncologie 089/80 83 30.

Bij problemen buiten de werkuren kunt u bellen naar de telefooncentrale van het ZOL 089/80 80 80 of de dienst Spoedgevallen.



SUCCES MET DE BEHANDELING

Productnaam	Therapie om de drie weken		Duur
	Dag 1 = dagkliniek	Dag 2 -21= thuis	
Kadcyla (trastuzumab-emtansine)	1 infuus		1ste keer over 90 minuten; vanaf 2de toediening over 30 minuten
Spoeling (NaCl)	1 infuus		