

Associatie MKA

• Consultatie ZOL
T 089/32 61 60
Secretariaat.MKA@zol.be

• Consultatie ZMK
T 089/ 50 97 47
mka@zmk.be

• Consultatie
Jaarbeurslaan
T 089/51 50 50
info@xentrojbl.be

Ziekenhuis Oost-Limburg

• Campus Sint-Jan

Dr. Luc Vrielinck
Dr. Serge Schepers
Dr. Sarah Van Slycke
Dr. Joeri Meyns
Dr. Guido Heijsters

Ziekenhuis Maas en Kempen

• Campus Bree
Dr. Sarah Van Slycke
Dr. Guido Heijsters
Dr. Serge Schepers

Privaatpraktijk Jaarbeurslaan

Dr. Luc Vrielinck
Dr. Serge Schepers
Dr. Joeri Meyns

Bedankt voor het vertrouwen in onze dienst. Wat volgt zijn een reeks raadgevingen en geruststellingen die je door je genezingsproces zullen leiden. Je behandeling duurt tot je volledig genezen bent. Je bent dus altijd welkom.

De bedoeling van de behandeling is eenvoudig.

In de eerste plaats zal het zieke infectieweefsel verwijderd worden. Dit zieke weefsel tast het kaakbeen aan en kan een bron zijn van druk, ongemak, pijn, fistelvorming en eventueel beschadiging van de buurtanden of de kaakzenuw. Dit infectieweefsel neemt meestal de vorm aan van een cyste en bevindt zich, zoals op de tekening te zien is, gewoonlijk dicht bij de wortelpunt van de tand. De wegname ervan gebeurt langs een kleine insnede, waarvoor je, net zoals bij de tandarts, verdoofd wordt.

In de tweede plaats zal de arts ook proberen de oorzaak van de infectie weg te nemen. De infectie wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van microben in het wortelkanaal van de tand. Daarom gebeurt er ook een chemische en een mechanische reiniging van alle wortelkanalen van de tand. Na deze reiniging wordt het wortelkanaal hermetisch afgesloten door een rubberen stift. Dit gebeurt, afhankelijk van het soort tand, ofwel tijdens de heelkundige ingreep ofwel kort ervoor in een aparte zitting. De toegang tot het wortelkanaal langs de tandkroon wordt daarna afgesloten met een voorlopige vulling.

Als het onmogelijk is om het wortelkanaal te zuiveren via de tandkroon, zal het wortelkanaal gereinigd en afgesloten worden langs het worteluiteinde (punt van de wortel) van de tand. In dat geval wordt de kroon van de tand niet aangeboord.

Van deze behandeling kan je nalast verwachten, maar dit hoeft geen reden tot ongerustheid te zijn:


Zwelling: Een flinke, dikke wang is te verwachten. Dit komt vooral voor als de hoektand aan de voorkant van de bovenkaak ligt en minder als de tand in het gehemelte ligt. Deze zwelling is meestal het hevigst na de 2de postoperatieve dag en begint na de 4de dag af te nemen.

Draadjes: De draadjes kunnen een vervelend en gespannen gevoel veroorzaken. Dat is normaal en stopt wanneer ze na 1 à 2 weken vanzelf opgelost zijn of verwijderd worden.

Napijn: Ongemak tot 'pijn' is normaal. De voorgeschreven medicatie is hiervoor doeltreffend. Wacht niet tot de pijn heel hevig is om een pijnstiller te nemen.

Temperatuur: Licht koorts daags na de ingreep is normaal. Rusten en veel drinken is dan het beste wat je kan doen.

Nabloeding: De eerste 12 tot 14 uur is nabloeden mogelijk. Je drukt dan best een zuiver tamponnetje of dik stukje gaas gedurende een 10-tal minuten tegen het tandvlees of het gehemelte.



Wat moet je zeker doen:

VANDAAG:

- je (indien) voorgeschreven antibiotica innemen.
- pijnstillers nemen voor de verdoving is uitgewerkt.
- je tong weghouden van de plaats van de ingreep.
- ijs op je wang houden (nooit op de naakte huid) gedurende de eerste 2 à 6 uren, dit gaat de zwelling tegen.
- eten en drinken mag, maar kan hinderlijk zijn, wacht hiermee tot de verdoving is uitgewerkt. Je kan naar behoefte kiezen voor normaal, zacht of vloeibaar voedsel.

VOLGENDE DAGEN:

- 24 uur na de ingreep mag je de mond spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel of met lauw zout water (1 koffielepel zout in 1 tas lauw water).
- neem je antibiotica en/of pijnmedicatie zoals voorgeschreven.
- houd je mond goed schoon. Poets je tanden zoals gewoonlijk, eventueel met een kleine, zachte kindertandenborstel.
- veel rust en een goede voeding bevorderen het genezingsproces.

Wat mag je zeker NIET doen:

- de eerste 24 uur mag je de mond niet spoelen en ook niet zuigen op de wonde. Dit veroorzaakt afbraak van de gevormde bloedklonter en kan leiden tot nabloedingen.
- de eerste 5 dagen drink je best géén alcohol en laat je ook best het roken achterwege. Alcohol en tabak veroorzaken de afbraak van de gevormde bloedklonter waardoor je kan gaan nabloeden.
- de eerste 24 uur drink of eet je best geen hete dingen.

Meestal is de behandelde tand voorzien van een witte noodvulling, die na genezing van de wonde door je eigen tandarts vervangen moet worden door een definitieve vulling (2 weken).

Wanneer er onverwacht toch nog problemen ontstaan en je je zorgen maakt, vragen we je ons rechtstreeks te contacteren op volgend telefoonnummer:

- tijdens kantooruren: 089/32 61 60
- buiten kantooruren: 089/32 58 20

Buiten de diensturen (8 tot 18uur) en gedurende het week-end zijn we onrechtstreeks bereikbaar via de dienst Spoedgevallen van het ziekenhuis: 089/32 51 40 of 089/32 51 20. We hopen dat deze informatie nuttig voor je was en wensen je van harte een heel vlot herstel.