

VOEDINGSEVALUATIE

Naam:

Datum:

PML:

VEILIGHEID EN STABILITEIT

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ☐ Stress | ☐ + | ☐ - |
| ☐ Fysiologisch | | |
| ☐ Motorisch | | |
| ☐ Status | | |
| ☐ Indicaties verslikken | ☐ + | ☐ - |

EFFICIËNTIE VOEDINGSVAARDIGHEDEN

☐ efficiënt ☐ Inefficiënt

- | | |
|--|-------|
| ☐ Gedronken | na 5' |
| ☐ Bolusverlies | na 5' |
| ☐ Intake | na 5' |
| ☐ Voedingsduur | |
| ☐ Gedronken | |
| ☐ Bolusverlies | |
| ☐ Intake | |
| ☐ Overall Transfer | |
| ☐ Proficiëntie | |
| ☐ Intake rate | |

- Overall transfer: % ml gedronken/ voorgeschreven ml, = > of = 80%
- Proficiëntie: % ml gedronken/ voorgeschreven ml tijdens eerste 5 min > 30%
- Rate of transfer: Aantal ml gedronken/ min voedingsduur > of = 1,5/min

C. Lau et al, 2011

VOEDINGSPLAN

VOEDINGSPLAN

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Fysiologisch | ☐ Pauzeren | ☐ Beperkt drinkvolume |
| ☐ Motorisch | ☐ Houding | |
| ☐ Neuro-gedragmatig | ☐ Inbakeren | ☐ Prikkels beperken |
| ☐ Voedingsvaardigheden | ☐ Externe pacing | ☐ Mondcontrole |
| | ☐ Orale stimulatie | |
| ☐ Ouder-Kind interactie | | |
| ☐ Fles | Speen | Stand |
| ☐ Andere: | | |
| ☐ Informatie aanpassingen voedingsplan | | |
| ☐ Consult logopedie | ☐ | |